14.0 ± 0.2



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición: Iprodione.. 500 a/ka ... Aditivos ... c.s.p. 1kg

Registro N° PQUA 833 - SENASA

Titular del Registro: INHAS S.A.C.

Calle Los Talladores 175 Urb, Industrial del Artesano

Ate, Lima, Perú, Telf: 959168770

JIXI AGROSINO BIOTECH CO.,LTD. Formulado por:

7 Huanyang East Road, Jixi County, Anhui Province,

Importado y

SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.

Av. Nicolás de Ayllón Nro. 2941 Dpto. 74 Z.I. El Agustino. Distribuido por:

Lima - Perú.

Telf.: (51) 01-644-9297

Contenido neto: 100 q

N° Lote

F. de Form. F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

Medidas en cm.

ω

+1

2



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en

- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

 Evite contacto con la piel y la ropa.

 Lutilice el equipo de proteçor personal surante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.

 No comer, beber ni fumar du una fel as operaciones de mezcla y aplicación.

 Realice la aplicación siguiento la dirección del viento.

 Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabon.

 Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

 Almacenar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

 Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y ventilado. Nunca junto a alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.

 No utilizar el envase vacio para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- PRIMEROS AUXILIOS
 Grupo quimico: Dicarboximida.
 En daso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al medico y muéstrele la etiqueta.
 En caso de ingestión no provoque el vómito sin supervisión médica, ni dar agua a la persona si está inconsciente o convulsiona.
 n caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 min. Lleve al páciente al offalmálogo.
- Infineditatifiente con agua impio documento de distributore de la contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.

 En caso de initialación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.

 Antidoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

TELEFÓNO DE EMERGENCIA CICOTOX 0-800-1-3040 CISPROQUIM 0-800-5087 ESSALUD 117 ó 0801-10200 INHAS S.A.C: 959168770

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya este envase perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.

 -No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases
- vacios. -No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o
- sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10

- -No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos
- -No aplicar en zonas con napas treaticas superriciales o con suelos alfamente permeables.
 -Peligroso para animales domésticos , fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 -En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
FUNGIFIT® 500 WP es un fungicida con acción preventiva y curativa,
que actua por contacto, inhibiendo el desarrollo del tubo germinativo de
las conidias y bloqueando el micello del hongo que invade los tejidos
sanos, interfere en el control de una serie de señales intracelulares que
controlan las funciones del hongo, lo que conlleva a su muerte.

FUNGIFIT® 500 WP se aplica en aspersión, previa mezcla con agua. Realizar una premezcla en un volumen menor de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerid y logiar una mezcla hornogenea. Aplicar con equipo en buen estado y

- FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN
 -Se deberá evaluar la incidencia y severidad de la enfermedad y las condiciones óptimas de desarrollo de estas, para proceder a la aplicación de FUNGIFIT 8500 WP.
- Se recomienda como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 2 campañas/año.
- campanas/ano.
 -La dosis máxima a aplicar es de 1 kg/ha.
 -En casos de reincidencia de la enfermedad aplicar otros fungicidas de diferente modo de acción.

Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD FUNGIFIT® 500 WP es incompatible con agentes oxidantes. En caso de duda, hacer una prueba previa de compatibilidad.

No se han observado síntomas de fitotoxicidad, de acuerdo a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de

Cuadro de Usos:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg / ha	(días)	(ppm)
FRESA	"Podredumbre gris / moho gris"	Botrytis cinerea	1.0	14	10

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carencia.











BOLSA TRILAMINADA ALUMINIO (ETIQUETA)