

32,0 ± 0,5

22,0 ± 0,5

FUNGIFIT®

500 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRICOLA
 POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Iprodione..... 500 g/kg
 Aditivos c.s.p.1kg

Registro N° PQUA 833 - SENASA

Titular de Registro:

INHAS S.A.C.
 Calle Los Talladores 175 Urb. Industrial del Artesano
 Ate. Lima. Perú. Telf: 959168770

Formulado por:

JIXI AGROSINO BIOTECH CO.,LTD.
 7 Huanyang East Road, Jixi County, Anhui Province, China.

Importado y Distribuido por:

SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.
 Av. Nicolás de Ayllón Nro. 2941 Dpto. 74 Z.I. El Agustino,
 Lima - Perú.
 Telf.: (51) 01-644-9297



Contenido neto: 500 g

N° Lote
 F. de Form.
 F. de Venc.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

3,0

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**

Medidas en cm.

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Utilice el equipo de protección personal durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y ventilado. Nunca junto a alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dicarboximida.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión no provoque el vómito sin supervisión médica, ni dar agua a la persona si está inconsciente o convulsiona.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 min. Lleve al paciente al oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

CICOTOX 0-800-1-3040
 CISPROQUIM 0-800-50847
 ESSALUD 117 6 0801-10200
 INHAS S.A.C. 959168770

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido destruya este envase perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FUNGIFIT® 500 WP es un fungicida con acción preventiva y curativa, que actúa por contacto, inhibiendo el desarrollo del tubo germinativo de las conidias y bloqueando el micelio del hongo que invade los tejidos sanos, interfiere en el control de una serie de señales intracelulares que controlan las funciones del hongo, lo que conlleva a su muerte.

FUNGIFIT® 500 WP se aplica en aspersión, previa mezcla con agua. Realizar una premezcla en un volumen menor de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido y lograr una mezcla homogénea. Aplicar con equipo en buen estado y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Se deberá evaluar la incidencia y severidad de la enfermedad y las condiciones óptimas de desarrollo de estas, para proceder a la aplicación de **FUNGIFIT® 500 WP**.
- Se recomienda como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 2 campañas/año.
- La dosis máxima a aplicar es de 1 kg/ha.
- En casos de reincidencia de la enfermedad aplicar otros fungicidas de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

FUNGIFIT® 500 WP es incompatible con agentes oxidantes. En caso de duda, hacer una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No se han observado síntomas de fitotoxicidad, de acuerdo a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de Usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg / ha	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
FRESA	"Podredumbre gris / moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	14	10

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.



BOLSA FLEXOGRAFIADA.