

### CONCENTRADO EMULSIONABLE – EC

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Difenoconazole ..... | 250 g/L   |
| Aditivos.....        | c.s.p. 1L |

- Este producto es nocivo por contacto.
- Causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No re envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- Grupo químico: Triazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- Si el contacto fuese por la piel, lavarse con abundante agua y jabón, retirando ropa y zapatos.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración si fuese necesario. Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático. Antídoto: No tiene antídoto específico.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:  
 CICOTOX: 0-800-1-3040 / ESSALUD: 117 (arutro) / CISPROQUIM: 0-800-5-0847

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION  
15 Hubu Street Nanjing, 210002, China Teléfono: +86 25 86895000 / Fax: +86 25 84400800

Av. Andromeda Mza. 12 Lt. 5 Urb. Matellini - Lima - Lima - Chorrillos. Teléfono: (01) 712-8320

NO INFLAMMABLE



Para la preparación verter la dosis a usar en un envase de agua, de tal modo que se forme una suspensión uniforme, luego agregar ésta al volumen de agua.  
SINODIFE® 250 EC se usa en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de conservación.

| Cultivo   | Plaga            |                               | Dosis       |               | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|------------------|-------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
|           | Nombre común     | Nombre científico             | L/ha        | L/200 L       |              |              |
| Esparrago | Mancha del peral | <i>Stemphylium vesicarium</i> |             | 0,200         | 7            | 0,05         |
|           | Roya             | <i>Puccinia asparagi</i>      | 0,50 - 0,65 |               | 21           | 0,03         |
|           | Cercosporiosis   | <i>Cercospora asparagi</i>    | 0,35        |               | 7            | 0,05         |
| Vid       | Oidiois          | <i>Erysiphe necator</i>       |             | 0,100 - 0,150 | 21           | 0,5          |
| Paprika   | Oidium           | <i>Leveillula taurica</i>     | 0,315       |               | 14           | 0,05         |
| Cebolla   | Alternariosis    | <i>Alternaria porri</i>       |             | 0,20          | 7            | 0,2          |
| Pimiento  | Tizon temprano   | <i>Alternaria solani</i>      |             | 0,20          | 7            | 0,8          |

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar cuando las condiciones agroecológicas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña.

**COMPATIBILIDAD:** SINODIFE® 250 EC es compatible con la mayoría de los agroquímicos más comunes.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

