

15,00 cm

# SINODIFE® 250 EC

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**Concentrado Emulsionable – EC**

## Composición Química:

Difenoconazole.....250 g/L  
Aditivos.....c.s.p. 1L

Registro PQUA Nº 820 - SENASA  
Titular del Registro: ANTALIEN SAC



**Importado y distribuido por:**  
ANTALIEN SAC  
Pj. Martir Olaya Nº 169 Of. 1001 Miraflores  
(Centro Empresarial José Pardo Torre C), Lima - Perú  
Teléfono (01) 445-7352 / E-mail: contactos@antalien.net

Contenido Neto: 5 L

Nº Lote: Formulado por:  
F. de Form: JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION  
F. de Venc: 15 Hubu Street Nanjing, 210002, China  
Teléfono: +86 25 86895000 / Fax: +86 25 84400800

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**



**NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Este producto es nocivo por contacto.  
Causa daño temporal a los ojos.  
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.  
Utilice ropa protectora durante el manejo y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol.  
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.  
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.  
No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.  
No re envasar o depositar el contenido en otros envases.  
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Triazoles.  
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa.  
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.  
Si el contacto fuese por la piel, lavarse con abundante agua y jabón, retirando ropa y zapatos.  
En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.  
En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración si fuese necesario. Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático. Antídoto: No tiene antídoto específico.

CICOTOX: 0800-13040 ó 328-7398 (gratuito) / ESSALUD: 117 (gratuito)  
CISPROQUIM: 0801-050-847 / ANTALIEN SAC: (01) 445-7352

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos.  
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.  
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.  
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.  
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SINODIFE® 250 EC es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa para el control de "Roya" *Puccinia asparagi* en el cultivo de espárrago.

### PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Verter la dosis a usar en un envase de agua, de tal modo que se forme una suspensión uniforme, luego agregar ésta al volumen de agua.

SINODIFE® 250 EC se usa en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de conservación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

### USOS Y DOSIS

Cultivo	Enfermedad / Patógeno		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0,50 - 0,65 L/ha	21	0,03

PC: Periodo de carencia / LMR: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar cuando las condiciones agroecológicas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada antes de las primeras 24 horas.

**FITOTOXICIDAD:** SINODIFE® 250 EC en la dosis y uso recomendados no muestra fitotoxicidad.

**COMPATIBILIDAD:** SINODIFE® 250 EC es compatible con la mayoría de los agroquímicos más comunes.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



14,50 cm

