

20,00 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

Este producto es nocivo por contacto.

Causa daño temporal a los ojos.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

No re envasar o depositar el contenido en otros envases.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Triazoles.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.

Si el contacto fuese por la piel, lavarse con abundante agua y jabón, retirando ropa y zapatos.

En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.

En caso de Inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración si fuese necesario. Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático. Antídoto: No tiene antídoto específico.

CICOTOX: 0800-13040 ó 328-7398 (gratuito) / **ESSALUD:** 117 (gratuito)**CISPROQUIM:** 0801-050-847 / **ANTALIEN SAC:** (01) 445-7352**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

SINODIFE® 250 EC**FUNGICIDA AGRÍCOLA****Concentrado emulsionable – EC****Composición Química:**

Difenoconazole.....250 g/L

Aditivos.....C.s.p. 1L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: ANTALIEN SAC

Formulado por:

SINOCHEM NINGBO LTD.

21 Jiangxia St., Ningbo China. Zip Code: 315000

Importado y distribuido por:

ANTALIEN SAC

Pj. Martir Olaya N° 169 Of. 1001 Miraflores

(Centro Empresarial José Pardo Torre C), Lima - Perú

Teléfono (01) 445-7352

E-mail: contactos@antalien.net

Contenido Neto: 10 L

N° Lote:

F. de Form:

F. de Venc:

**NO INFLAMABLE****NO CORROSIVO****NO EXPLOSIVO****MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO****MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS****INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO****SINODIFE® 250 SC** es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa para el control de "Roya" *Puccinia asparagi* en el cultivo de espárrago.**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA**

Verter la dosis a usar en un envase de agua, de tal modo que se forme una suspensión uniforme, luego agregar ésta al volumen de agua.

SINODIFE® 250 EC se usa en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de conservación.**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"****USOS Y DOSIS**

Cultivo	Enfermedad / Patógeno		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Esparrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0.50 - 0.65 L/ha	21	0.03

PC: Período de carencia / **LMR:** Límite máximo de residuos**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar cuando las condiciones agroecológicas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada antes de las primeras 24 horas.

FITOTOXICIDAD:**SINODIFE® 250 EC** en la dosis y uso recomendados no muestra fitotoxicidad.**COMPATIBILIDAD:****SINODIFE® 250 EC** es compatible con la mayoría de los agroquímicos más comunes.**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



14,00 cm