

20,00 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

Este producto es nocivo por contacto. Causa daño temporal a los ojos. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No re envasar o depositar el contenido en otros envases. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo químico: Triazoles. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Si el contacto fuese por la piel, lavarse con abundante agua y jabón, retirando ropa y zapatos. En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración. En caso de Inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración si fuese necesario. Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático. Antídoto: No tiene antídoto específico.

**CICOTOX:** 0800-13040 ó 328-7398 (gratuito) / **ESSALUD:** 117 (gratuito)  
**CISPROQUIM:** 0801-050-847 / **ANTALIEN SAC:** (01) 445-7352

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# SINODIFE® 250 EC

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**Concentrado emulsionable – EC**

**Composición Química:**

Difenoconazole.....250 g/L  
Aditivos.....c.s.p. 1L

Registro PQUA Nº 820 - SENASA

Titular del Registro: **ANTALIEN SAC**

**Formulado por:**  
JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION

15 Hubu Street Nanjing, 210002, China

Teléfono: +86 25 86895000 / Fax: +86 25 84400800

**Importado y distribuido por:**

**ANTALIEN SAC**

Calle Arica Nro. 125 Oficina. 401 – Miraflores - Lima

Teléfono: (01) 445-7352

**Contenido Neto: 10 L**

Nº Lote:  
F. de Form:  
F. de Venc:



**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**



**MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**SINODIFE® 250 EC** es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa. Es absorbido por las hojas con una fuerte translocación translaminar acropétala.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA**

Verter la dosis a usar en un envase de agua, de tal modo que se forme una suspensión uniforme, luego agregar ésta al volumen de agua.

**SINODIFE® 250 EC** se usa en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de conservación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**USOS Y DOSIS**

Cultivo	Enfermedad / Patógeno		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0,200 L/200 L	7	0,05
	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0,50 - 0,65 L/ha	21	0,03
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0,100 - 0,150 L/200 L	21	0,5

**PC:** Período de carencia / **LMR:** Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar cuando las condiciones agroecológicas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No ingresar al área tratada antes de las primeras 24 horas.

**FITOTOXICIDAD:**

**SINODIFE® 250 EC** en la dosis y uso recomendados no muestra fitotoxicidad.

**COMPATIBILIDAD:**

**SINODIFE® 250 EC** es compatible con la mayoría de los agroquímicos más comunes.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



14,00 cm