

20,00 cm

SINODIFE® 250 EC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado emulsionable – EC

Composición Química:

Difenoconazole.....250 g/L
Aditivos.....C.s.p. 1L

Registro PQUA N° 820 - SENASA

Titular del Registro: ANTALIEN SAC

Formulado por:

SINOCHEM NINGBO LTD.

21 JiangXia St., Ningbo China. Zip Code: 315000

Importado y distribuido por:

ANTALIEN SAC

Calle Arica Nro. 125 Oficina. 401 – Miraflores - Lima

Teléfono: (01) 445-7352

Contenido Neto: 20 L



Calidad para la Agricultura


N° Lote:
F. de Form:
F. de Venc:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Este producto es nocivo por contacto.

Causa daño temporal a los ojos.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

Utilice ropa protectora durante el manejo y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

No re envasar o depositar el contenido en otros envases.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Triazoles.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.

Si el contacto fuese por la piel, lavarse con abundante agua y jabón, retirando ropa y zapatos.

En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración si fuese necesario.

CICOTOX: 0800-12040 ó 329-7298 (gratuito) / ESSALUD: 117 (gratuito)

CISPROQUIM: 0801-050-847 / ANTALIEN SAC: (01) 445-7352

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devolva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligro para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

Peligro para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SINODIFE® 250 SC es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa para el control de "Roya" *Puccinia asparagi* en el cultivo de espárrago.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Verter la dosis a usar en un envase de agua, de tal modo que se forme una suspensión uniforme, luego agregar ésta al volumen de agua.

SINODIFE® 250 EC se usa en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de conservación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USOS Y DOSIS

Cultivo	Enfermedad / Patógeno		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0,50 - 0,65 L/ha	21	0,03

PC: Período de carencia / LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar cuando las condiciones agroecológicas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las primeras 24 horas.

FITOTOXICIDAD: SINODIFE® 250 EC en la dosis y uso recomendados no muestra fitotoxicidad.

COMPATIBILIDAD: SINODIFE® 250 EC es compatible con la mayoría de los agroquímicos más comunes.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

14,00 cm