

PRESSOR®
REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS
DE USO AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:		
Paclobutrazol		250 g/L
Aditivos		csp 1L

PQUA Nº 838- SENASA



**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Formulador:
**JIANGSU UNITED
AGROCHEMICAL CO. LTD.**
11 Zitanyaju, 126 Megdu street
Nanjing - China

Fecha de Formulación	:	
N° de Lote	:	
Contenido Neto	:	4 L
Fecha de Vencimiento	:	

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

 - Ligeramente peligroso si es ingerido.
 - Ligeramente peligroso si es inhalado.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
 - Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 12 primeras horas después de la aplicación.
 - Durante la aplicación, como en todos los agroquímicos, evitar el contacto directo con el producto. Evite respirar la aspersión.
 - Después de la mezcla y aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
 - El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
 - Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados.
 - Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
 - Usar solamente el producto que viene en envases originales.
 - No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos o bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS:

 - Grupo químico: Triazol.
 - En caso de inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, de respiración artificial si es necesario. Llevar al paciente al médico.
 - En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso que aparezca irritación.
 - En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 minutos. Consultar con el médico.
 - En caso de ingestión accidental: Llamar al médico inmediatamente. Dar a beber abundante agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o un doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.
 - **Nota al médico:** Tratar de acuerdo a los síntomas, no se conoce antídoto específico.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

 - Peligroso para organismos acuáticos, plantas terrestres no objetivos, acuáticas y semi-acuáticas.
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.
 - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

 - **PRESSOR** es un regulador de crecimiento que es tomado por el xilema a través de las hojas, tallos y raíces, luego es translocado a los meristemas de crecimiento sub-apicales. Produce plantas más compactas y aumentan la floración y fructificación. Inhibe la biosíntesis de las giberelinas por medio de la inhibición de la conversión del ent-kaureno o ácido ent-kaurénico, la dimetilación y la tasa de división celular.
 - De acuerdo a la recomendación de uso de **PRESSOR**, la aplicación se realiza en la etapa de floración observándose una brotación (yemas vegetativas) uniforme en el campo. La aplicación se realiza en forma dirigida a la parte aérea, con gota fina dirigida a los brotes como un rocío o lluvia evitando chorreos.
 - Se calcula la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende aplicar. Se coloca en el tanque de mezcla del agua a emplear, se adiciona la cantidad de **PRESSOR** de acuerdo a la dosis recomendada y se agita, para finalmente completar con el resto de agua.
- FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Se recomienda realizar las aplicaciones en la época de floración del cultivo un máximo de 2 aplicaciones por campaña y un intervalo de 15 días entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta 1 hora después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Evitar su mezcla con materiales oxidantes y alcalinos. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.
- TELÉFONO DE EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita). ESSALUD: 411-8000 Opción 4.
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase (botella de plástico) y vierta la solución en la mezcla de aplicación luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	APLICACIÓN	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
		%	L/Ha		
Palto (Persea americana)	Controla el crecimiento vegetativo y favorece el cuajado y retención del fruto.	0.3 - 0.8	1.0 - 2.5	28	0.05

PC: Periodo de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos

