

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: BENZOYLUREA
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lávese con abundante agua y jabón.

**TÉLEFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400  
ALO EMBALUD: 0801-20200 (Gratuito)

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilízelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces: no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abejas.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.



Contenido neto: 100 L  
N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

NO CORROSIVO

**VERSATIL**  
**50 EC**

**INSECTICIDA AGRICOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

**COMPOSICIÓN:**

Lufenuron ..... 50 g/L  
Solvente nafta alifático ligero ..... 450 g/L  
Aditivos c.s.p ..... 1 L

Reg. PQUA N° 210 - SENASA  
Titular del Registro, Importador y Distribuidor por:  
NEO AGRUM SAC

**neogrum**

Calle Cantuzas 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Formulado por:  
SINOCHEN AGRO CO., LTD.  
17-19 th Floor N°33, He Nan Road(s) Shanghai, 200002  
CHINA

**INFLAMABLE**

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

VERSATIL 50 EC es un insecticida sistémico inhibidor del crecimiento que interfiere en la síntesis de quitina en los artrópodos plagas.

VERSATIL 50 EC es utilizado para el control del Gusano Perforador de bellotas y Gusano comedor de hojas en los cultivos de algodón y espárrago.

VERSATIL 50 EC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, de baja toxicidad para las personas y animales de sangre caliente.

-CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÍ NOMO-

**CUADRO DE USOS:**

| CULTIVO   | PLAGAS                        |                              | DOSIS     |        | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|--------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común                  | Nombre Técnico               | L / 200 L | L / ha |                |                 |
| Algodón   | Gusano perforador de bellotas | <i>Heliothis virescens</i>   | 0.25      | 0.5    | 30             | 0.01            |
| Espárrago | Gusano comedor de hojas       | <i>Coplataria decolora</i>   | 0.2       | 0.4    | 14             | 0.02            |
|           | Gusano perforador             | <i>Heliothis virescens</i>   | 0.2       | 0.4    | 7              | 0.02            |
| Maíz      | Cogollero                     | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.2       | 0.4    | 35             | 0.05            |
| Pimiento  | Gusano perforador             | <i>Heliothis virescens</i>   | 0.25      | 0.5    | 7              | 1               |
| Tomate    | Gusano ejército               | <i>Spodoptera eridania</i>   | 0.15      | 0.3    | 7              | 0.5             |

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Iniciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel de daño económico lo justifique y cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Realizar hasta 2 aplicaciones por campo/cultivo.

**PERÍODO DE REINGRESO:** Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** VERSATIL 50 EC puede ser empleado en mezclas con la mayoría de insecticidas, fungicidas y coadyuvantes de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes.

**FITOTOXICIDAD:** VERSATIL 50 EC no es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Usar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: BENZOYLUREA
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

**TÉLFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 017-6400  
ALO ESSALUD: 0801-23200 (Gratuito)

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DERECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inculle o perforándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces: no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abejas.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



Contenido neto: 100 L  
N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Ven.:

NO CORROSIVO

Formulado por  
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD  
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou,  
Zhejiang Province  
CHINA

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**VERSATIL**  
**50 EC**

**INSECTICIDA AGRICOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

**COMPOSICIÓN:**

Lufenuron ..... 50 g/L  
Solvente nafta alifático ligero ..... 450 g/L  
Aditivos c.s.p ..... 1 L

Reg. PDUA N° 210 - SENASA  
Titular del Registro, Importador y Distribuidor por:  
NEOAGRUM SAC

**neoagrum**

Calle Ceruarías 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 017-6400 / Fax: 017-6401

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

VERSATIL 50 EC es un insecticida sistémico inhibidor del crecimiento que interfiere en la síntesis de quitina en los artrópodos plagas.

VERSATIL 50 EC es utilizado para el control del Gusano Perforador de bellotas y Gusano comedor de hojas en los cultivos de algodón y espárrago.

VERSATIL 50 EC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, de baja toxicidad para las personas y animales de sangre caliente.

-CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÍ. NOMO\*

**CUADRO DE USOS:**

| CULTIVO   | PLAGAS                        |                              | DOSIS     |        | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|--------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común                  | Nombre Técnico               | L / 200 L | L / ha |                |                 |
| Algodón   | Gusano perforador de bellotas | <i>Heliothis virescens</i>   | 0.25      | 0.5    | 30             | 0.01            |
|           | Gusano comedor de hojas       | <i>Coplaris decolora</i>     | 0.2       | 0.4    | 14             | 0.02            |
| Espárrago | Gusano perforador             | <i>Heliothis virescens</i>   | 0.2       | 0.4    | 7              | 0.02            |
| Maíz      | Cogollero                     | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.2       | 0.4    | 35             | 0.05            |
| Pimiento  | Gusano perforador             | <i>Heliothis virescens</i>   | 0.25      | 0.5    | 7              | 1               |
| Tomate    | Gusano ejército               | <i>Spodoptera eridania</i>   | 0.15      | 0.3    | 7              | 0.5             |

P.C.: Período de carencia

LMR: Límites máximos de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Iniciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel de daño económico lo justifique y cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo.

**PERÍODO DE REINGRESO:** Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** VERSATIL 50 EC puede ser empleado en mezclas con la mayoría de insecticidas, fungicidas y coadyuvantes de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes.

**FITOTOXICIDAD:** VERSATIL 50 EC no es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: BENZOYLUREA
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

**TÉLEFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400  
ALO ESSALUD: 0801-20200 (Gratuito)

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abejas.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



**VERSATIL**  
**50 EC**

**INSECTICIDA AGRICOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

**COMPOSICIÓN:**

Lufenuron ..... 50 g/L  
Solvente nafta alifático ligero ..... 450 g/L  
Aditivos c.a.p ..... 1 L

Reg. PQUA N° 210 - SENASA  
Titular del Registro, Importador y Distribuidor por:  
**NEOAGRUM SAC**

**neogrump**

Calle Carhuas 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 100 L  
N° de Lote:  
F de Form.:  
F de Venc.:

Formulado por:  
SINOCHEN NINGBO LTD.  
21 Jiangxia St. Ningbo 315000  
CHINA

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

VERSATIL 50 EC es un insecticida sistémico inhibidor del crecimiento que interfiere en la síntesis de quitina en los artrópodos plagas.  
VERSATIL 50 EC es utilizado para el control del Gusano Perforador de bellotas y Gusano comedor de hojas en los cultivos de algodón y espárrago.  
VERSATIL 50 EC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, de baja toxicidad para las personas y animales de sangre caliente.

-CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÍCOLA NOMO-

**CUADRO DE USOS:**

| CULTIVO   | PLAGAS                        |                              | DOSIS     |        | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|--------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común                  | Nombre Técnico               | L / 200 L | L / ha |                |                 |
| Algodón   | Gusano perforador de bellotas | <i>Heliothis virescens</i>   | 0.25      | 0.5    | 30             | 0.01            |
| Espárrago | Gusano comedor de hojas       | <i>Copitarsia decolora</i>   | 0.2       | 0.4    | 14             | 0.02            |
|           | Gusano perforador             | <i>Heliothis virescens</i>   | 0.2       | 0.4    | 7              | 0.02            |
| Maíz      | Cogollero                     | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.2       | 0.4    | 35             | 0.05            |
| Pimiento  | Gusano perforador             | <i>Heliothis virescens</i>   | 0.25      | 0.5    | 7              | 1               |
| Tomate    | Gusano ejército               | <i>Spodoptera eridania</i>   | 0.15      | 0.3    | 7              | 0.5             |

P.C.: Período de carencia

LMR: Límites máximos de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Iniciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel de daño económico lo justifique y cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo.

**PERÍODO DE REINGRESO:** Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** VERSATIL 50 EC puede ser empleado en mezclas con la mayoría de insecticidas, fungicidas y coadyuvantes de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes.

**FITOTOXICIDAD:** VERSATIL 50 EC no es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

