

14.5 cm

48 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado, cerrado y en un lugar fresco y seco.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón y cambiarse, lavar la ropa contaminada.
- Usar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 48 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Evitar el contacto con los ojos (usar anteojos de protección), la piel y la ropa.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Fitosanitarios.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca. Tratamiento médico puede ser requerido, y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar bien ventilado; respiración artificial puede ser requerida.
- No dar de beber nada ni inducir al vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- No se conoce antídoto específico. Sigue tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilízalo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, esteros, lagos o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobras del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.



Contenido neto: 200 L
N° de Lote:
F. de Form.
F. de Vinc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

HUELLA

720 SL

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:
2,4 D Seí émina 720 g/L
Aditivos csp. 1L

Reg. PQUA N° 358 - SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM SAC

neogrum

Calle Centurias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 817-6400 / Fax: 817-6401

Formulado por:
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO. LTD
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou,
Zhejiang Province
CHINA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

HUELLA 720 SL es un herbicida selectivo, sistémico, de acción hormonal y de baja volatilidad. Es utilizado para el control de malezas en el cultivo de café de azúcar.

En caso de café de azúcar aplicar HUELLA 720 SL en post-emergencia, cuando las plantas superen los 20 cm de altura.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Café de Azúcar	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	3.0	No reportado	0.05
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>			
	Higuera	<i>Ricinus communis</i>			
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
	Alfalfa	<i>Melilotus indicus</i>			
Maíz	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	1.5 - 2.0	7	0.05
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			

P.C. Período de carencia

L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Por lo general, la etapa apropiada para la aplicación de HUELLA 720 SL es desde la germinación hasta los 25 días posteriores. Se recomienda no realizar más de 2 aplicaciones por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 48 horas de realizada la aplicación.


COMPATIBILIDAD: Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina, con productos oxidantes y ácidos fuertes.

FITOTOXICIDAD: HUELLA 720 SL no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



VERSIÓN 02-HZ
ÚLTIMA REVISIÓN: 06-12-12

0000

48 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado, cerrado y en un lugar fresco y seco.
- Después de usar el producto, lávese con abundante agua y jabón y cambie la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 48 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Evitar el contacto con los ojos (usar anteojos de protección), la piel y la ropa.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Fungicidas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca. Tratamiento médico puede ser requerido, y el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar bien ventilado, respiración artificial puede ser requerida.
- No dar de beber nada ni inducir al vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- No se conoce antídoto específico. Sigla tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, esteros o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.



HUELLA 720 SL

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:

2,4 D Sal amina 720 g/l
Aditivos csp 1L

Reg. PQUA N° 358 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM SAC

neogrum

Calle Centaúros 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 011-4400 / Fax: 011-4401

Contenido neto: 200 L

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Formulado por
SHANGHAI WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD
6th Floor, Georushuangyue Centre, Shenchua Road
750, Jinan Shandong
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

HUELLA 720 SL es un herbicida selectivo, sistémico, de acción hormonal y de baja volatilidad. Es utilizado para el control de malezas en el cultivo de caña de azúcar.

En caso de caña de azúcar aplicar HUELLA 720 SL en post-emergencia, cuando las plantas superen los 20 cm de altura.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de Azúcar	Yuyo Verdolega	<i>Amaranthus dubius</i>	3.0	No reportado	0.05
	Amor seco	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Higuera	<i>Bidens pilosa</i>			
	Chamico	<i>Ricinus communis</i>			
	Alfalfa	<i>Datura stramonium</i>			
	Arleño	<i>Melilotus indicus</i>			
Maíz	Yuyo Verdolega	<i>Amaranthus dubius</i>	1.5 - 2.0	7	0.05
	Chamico	<i>Portulaca oleracea</i>			

P.C. Período de carencia

L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Por lo general, la etapa apropiada para la aplicación de HUELLA 720 SL es desde la germinación hasta los 25 días posteriores. Se recomienda no realizar más de 2 aplicaciones por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 48 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina, con productos oxidantes y ácidos fuertes.

FITOTOXICIDAD: HUELLA 720 SL no es fitotóxico al se aplica en los momentos y dosis recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



VERSIÓN 02-HZ
ULTIMA REVISIÓN: 06-12-12

0011

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado, cerrado y en un lugar fresco y seco.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón y cámbiese.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 48 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Evitar el contacto con los ojos (usar anteojos de protección), la piel y la ropa.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Fungicidas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca. Tratamiento médico puede ser requerido; y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar bien ventilado, respiración artificial puede ser requerida.
- No dar de beber nada ni inducir al vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- No se conoce antídoto específico. Siga tratamiento sintomático.

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego sulfatelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobornos del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.



Contenido neto: 200 L

Nº de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

HUELLA

720 SL

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:

2,4 D Sal amina

Aditivos

720 g/l

csp. 1L

Reg. PQUA N° 358 - SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM SAC

neogrump

Calle Centinaria 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 817-8400 / Fax: 817-8401

Formulado por

SINOCHEMAGRO CO. LTD

17-19 th Floor N°33, He'an Road(s) Shanghai,

200002 PR

CHINA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

HUELLA 720 SL es un herbicida selectivo, sistémico, de acción hormonal y de baja volatilidad. Es utilizado para el control de malezas en el cultivo de caña de azúcar.

En caso de caña de azúcar aplicar HUELLA 720 SL en post-emergencia, cuando las plantas superen los 20 cm de altura

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de Azúcar	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	3.0	No reportado	0.05
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>			
	Higuera	<i>Ricinus communis</i>			
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
	Alfalfa	<i>Melilotus indicus</i>			
Maíz	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	1.5 - 2.0	7	0.05
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			

P.C. Período de carencia

L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Por lo general, la etapa apropiada para la aplicación de HUELLA 720 SL es desde la germinación hasta los 25 días posteriores. Se recomienda no realizar más de 2 aplicaciones por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 48 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina, con productos oxidantes y ácidos fuertes.

FITOTOXICIDAD: HUELLA 720 SL no es fitotóxico al se aplica en los momentos y dosis recomendados

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



48 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado, cerrado y en un lugar fresco y seco.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón y cámbiese, lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 48 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Evitar el contacto con los ojos (usar anteojos de protección), la piel y la ropa.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Fungicidas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, levante con abundante agua fresca, tratamiento médico puede ser requerido; y si el contacto fuera con la piel, levante con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar bien ventilado; respiración artificial puede ser requerida.
- No dar de beber nada ni induzca al vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- No se conoce antídoto específico. Siga tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 EBSALUD EN LÍNEA: 411-8000

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilízalo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
Dispositivo el envase triple lavado al centro de acople autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- Peligroso para ríos, estanques o embalses con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

HUELLA 720 SL

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:
2,4 D Sal amina 720 g/L
Aditivos csp 1L

Reg. PQUA N° 358 - SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM SAC

neogrump

Calle Cantuzas 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 817-8400 / Fax: 817-8401

Contenido neto: 200 L

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Formulado por
SINOCHEM HUNZBO LTD
21 Sangos SL Hongo 315200
CHINA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

HUELLA 720 SL es un herbicida selectivo, sistémico, de acción hormonal y de baja volatilidad. Es utilizado para el control de malezas en el cultivo de caña de azúcar.

En caso de caña de azúcar aplicar HUELLA 720 SL en post-emergencia, cuando las plantas superen los 20 cm de altura.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de Azúcar	Yuyo Verdolaga	<i>Amaranthus dubius</i>	3.0	No reportado	0.05
	Amor seco	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Higuera	<i>Bidens pilosa</i>			
	Chamico	<i>Ricinus communis</i>			
	Alfalfa	<i>Datura stramonium</i>			
	Artallo	<i>Melilotus indicus</i>			
Maíz	Yuyo Verdolaga	<i>Amaranthus dubius</i>	1.5 - 2.0	7	0.05
	Chamico	<i>Portulaca oleracea</i>			

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Por lo general, la etapa apropiada para la aplicación de HUELLA 720 SL es desde la germinación hasta los 25 días posteriores. Se recomienda no realizar más de 2 aplicaciones por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 48 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina, con productos oxidantes y ácidos fuertes.

FITOTOXICIDAD: HUELLA 720 SL no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



VERSIÓN 02-HZ
ULTIMA REVISIÓN: 06-12-12

0013