CURAMAX

FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Reg. Producto No.

-AG-SENASA

Titular del Registro:

ITAGRO S.A.

Formulado por:

NANJING BESTGREEN CHEMICAL CO., LTD

Add: Room 2101, Overseas Chinese Plaza, No.1 North Daqiao Road, Nanjing China FAX: 86-25-58630299 Email:shlmhg@sina.com

Importado y distribuido por:



INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A. Av. La Fontana N° 1355 Of. 201 La Molina Telefax: (01) 349-6805 Lima - Perú

Contenido Neto: 1 Kilo

No. Lote:

Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- Cuidado este producto puede ser dañino si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Evite aspirar la neblina de aspersión.
- Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicacion (use guantes, botas, overol de dos piezas, gafas de proteccion y respirador para ingresar al area
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos y agua para consumo.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene en casa de habitación.

PRIMEROS AUXILIOS:

- GRUPO QUIMICO: Acetamida + Dithiocarbamato
- En caso de intoxicacion, llame al medico inmediatamente y muestrele la copia de esta eigueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavelos inmediatamente con abundante agua durante, minimo 15 minutos. Consulte con un medico.
- En caso de contacto con la piel, lavese inmediatamente la parte afectada con abundante agua. Consulte con un medico.
- ° En caso de ingestion, inmediatamente llame a un medico o comuniquese con los telefonos de emergencia para recibir asistencia.
- No induzca el vomito a menos que sea indicado por un medico o por el Centro de Atencion Toxicologica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

ANTÍDOTO: No existe un antídoto específico. Su tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: EN CASO DE INTOXICACIÓN (24 horas): CICOTOX 0800-13040 CISPROQUIM 0800-50847 Salud en Línea 0801-10200 opción 4

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuaticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacios.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar la banda de no aplicacion hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domesticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en la zona tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: CURAMAX es fungicida de acción preventiva y curativa por ser sistémico, y de contacto.

CURAMAX se aplica a las plantas en aspersión toliar preventivamente o con los primeros síntomas de la enfermedad.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Disuelva completamente la cantidad de CURAMAX en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla que contenga agua hasta 3/4 ó la mitad, complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla cada vez que vaya a llenar el equipo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

RECOMENDACIONES DE LISO Y DOSIS.

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS			LMR (PPM)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	kg/ha	Kg/cil 200 litros	P.C. (DIAS)	CYMOXANIL	
Papa	Rancha o Hielo fungoso o Seca seca	Phytophthora infestans	1.5 2.0	0.5	14	0.05(*)	0.2 ^{e)}

P.C.: Periodo de Carencia

LMR: Limite Maximo de Residuos

FRECUENCIAY EPOCA DE APLICACIÓN: Dependiendo de las condi-ciones del clima y del ambiente que favorezcan la enfermedad, las aplicaciones pueden iniciarse temprano en el ciclo de cultivo y terminarse en la etapa reproductiva cuando los frutos alcanzan su madurez fisiológica. Similarmente, los períodos entre una aplicación y la siguiente pueden ser menor a 10 dias.

No realizar más de 2 aplicaciones, rotando con otros productos de diferente mecanismo de acción.

PERÍODO DE REINGRESO: Ingrese al área tratada después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: CURAMAX es compatible con los plaguicidas que son compatibles con Mancozeb. Si el producto compañero de la mezcla aumenta el pH del agua por encima de 8.5, entonces la fracción correspondiente al Cimoxanil sufre degradación. En el caso de que se desconozca la compatibilidad hay necesidad de hacer una prueba previa a su uso.

FITOTOXICIDAD: CURAMAX, no causa sintomas de fitotoxicidad en los cultivos indicados a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.





























