

CURAMAX

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Cimoxanil	80 g/kg
Mancozeb	640 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1/kg

Registro: PQUA N° 850-SENASA

Titular del Registro:

ITAGRO S.A.

Fabricante y Formulador:

SINOCHEM AGRO CO. LTD.

17-19 Th Fl, N°33 Henan Road(s) Shanghai
200002. PR. - CHINA

Telf. 86-21-63181805, Fax: 86-21-63375874

Importado y distribuido por:



INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ
Av. La Fontana N° 1355 Of. 201 La Molina
Telefax: (01) 349-6805

Contenido Neto: 1.0 Kg

N° Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION.

Cuidado este producto puede ser dañino si se ingiere. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Evite aspirar la neblina de aspersión.

Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación use guantes, botas, overol de dos piezas, gafas de protección y respirador para ingresar al área tratada.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos y agua para consumo.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

No almacene en casa de habitación

PRIMEROS AUXILIOS:

GRUPO QUINIICO. Acetamida + Dithiocarbamato

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente y muéstrela la copia de esta etiqueta.

En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua durante, mínimo 15 minutos. Consulte con un médico.

En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua. Consulte con un médico.

En caso de ingestión, inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia.

No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

ANTÍDOTO: No existe un antídoto específico. Su tratamiento es sintomático. **TELÉFONO DE EMERGENCIA: EN CASO DE INTOXICACIÓN (24 horas):** CICOTOX 0800-13040 CISPROQUIM 0800-50847 Salud en Línea 0801-10200 opción.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar la banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en la zona tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: CURAMAX es fungicida de acción preventiva y curativa por ser sistémico y de contacto. **CURAMAX** se aplica a las plantas en aspersión foliar preventivamente o con los primeros síntomas de la enfermedad.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Disuelva completamente a cantidad de **CURAMAX** en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla que contenga agua hasta 3/4 ó la mitad, complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla cada vez que vaya a llenar el equipo.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION:

Dependiendo de las condiciones del clima y del ambiente que favorezcan la enfermedad, las aplicaciones pueden iniciarse temprano en el ciclo de cultivo y terminarse en la etapa reproductiva cuando los frutos alcanzan su madurez fisiológica, similarmente, los periodos entre una aplicación y la siguiente pueden ser menor a 10 días.

No realizar más de 2 aplicaciones, rotando con otros productos de diferente mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO:

Ingresé al área tratada después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

CURAMAX es compatible con los plaguicidas que son compatibles con Mancozeb. Si el producto compañero de la mezcla aumenta el pH del agua por encima de 8.5, entonces la fracción correspondiente al Cimoxanil sufre degradación. En el caso de que se desconozca la compatibilidad hay necesidad de hacer una prueba previa a su uso.

FITOTOXICIDAD:

CURAMAX, no causa síntomas de fitotoxicidad en los cultivos indicados a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"
RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS:**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (Dias)	LMR (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	kg/ha	kg/cil 200 litros		CYMOXANIL	MANCOZEB
Papa	Rancha o Hielo fungoso o seca seca	Phytophthora infestans	1.5 2.0	0.5	14	0.05	0.2
Cebolla	Mildiu	Peronospora destructor	1.5	0.5	18	0.5	1.0

**P.C.: Periodo de Carencia
LMR: Limite Máximo de Residuos**

