PROYECTO DE ETIQUETA - MYCLOMEX - PRESENTACIÓN DE 250 g (Formulado en China)

MYCLOMEX

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Reg. N°

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**

Fabricado y formulado por:

JIANGSU FLAG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

No. 309, Changfenghe Road, Nanjing Chemical Industrial Park, Nanjing, China 2100047.



Importado y Distribuido por:

FARMEX S.A.

Calle Dean Valdivia 148, Piso 7, San Isidro, Lima-27, Perú. Teléfono: (01)630-6400. Fax: (01)630-6410.

N° de Lote Fecha de Formulación Fecha de Vencimiento

Contenido Neto : 250 gramos

> NO NO **CORROSIVO INFLAMABLE EXPLOSIVO**

LEA DETENIDAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto puede ser mortal si se ingiere. Causa irritación moderada a los oios.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla v
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado. etiquetado v aleiado de alimentos para consumo humano o
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que hava contenido plaquicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Triazoles
- Teléfonos de Emergencia: Central de Urgencias y Emergencias de ESSALUD: 117 (línea gratuita), CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita) ó (01)328-7398, Farmex S.A.: (01) 630-6400.
- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vómito, especialmente si el paciente está
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante
- En caso de contacto con los ojos, efectuar una limpieza con bastante agua, aplicada en los ojos en forma de chorro durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

NOTA AL MÉDICO

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente v muéstrele la etiqueta.
- No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MYCLOMEX es un fungicida sistémico, rápidamente absorbido por el follaje y traslocado vía xilema, y que posee acción preventiva, curativa y erradicante. Es un fungicida perteneciente al grupo de los triazoles, que actúa interfiriendo e inhibiendo la síntesis del ergosterol, componente fundamental de las paredes celulares de los hongos que controla.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

MYCLOMEX se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla. Ilene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

FRECUENCIA Y NÚMERO DE APLICACIONES

No realizar más de 2 aplicaciones/campaña/año. El intervalo de aplicación es 15 días o más.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este periodo

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción alcalina, azufres y cobres. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

MYCLOMEX no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneia de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO" **CUADRO DE USOS Y DOSIS:**

Cultivo	Enfermedad		Decie		DC	LMD
	Nombre	Nombre	Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	común	científico	g/Ha	g/cil	(uias)	(ppiii)
Alcachofa	Oidiosis	Leveillula taurica	-	100-150	3	0.5
Capsicum annuum (pimientos, páprika, piquillo)	Oidiosis	Leveillula taurica	ı	100-150	3	0.5
Vid	Oidiosis	Erysiphe necator	200-300	-	14	1

PC: Período de Carencia. LMR: Límite Máximo de Residuos.

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**























