


MYCLOMEX

POLVO MOJABLE - WP

Mycobutanil.....	400 g/kg
Aditivos.....	600 g/kg

- Nombre común ISO: myclobutanil
- Nombre químico: 2-(4-chlorophenyl)-2-(1*H*-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile
- Grupo químico: triazoles.
- Fórmula empírica: C₁₅H₁₇ClN₄
- Peso molecular: 288.8 g/mol
- Punto de fusión: 63 – 68 °C.
- Solubilidad en agua: 1.24 x 10⁻¹ g/L
- Soluble en acetona, ethyl acetato, metanol y n-heptano
- Fórmula estructural:

- Aspecto: sólido en polvo.
- Densidad relativa: 240 - 260 g/L
- pH: 5.5 – 8.5.
- Persistencia de espuma: 20 mL en 1 min.
- Humedad: 3% máx.
- Humectabilidad: 120 seg. máx.
- Estabilidad en almacenamiento: 2 años
- Material de envases: bolsa de polietileno
- Presentaciones: 250 g, 2 kg y 20 kg.



Fabricado y formulado por:
Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd.
No. 309, Changfenghe Road, Nanjing Chemical
Industrial Park, Nanjing, China 2100047.

Importado y Distribuido por: **FARMEX S.A.**
Calle Dean Valdivia 148, Piso 7. San Isidro, Lima 27.
Telf.: (01) 630-640.

**NO
CORROSIVO**

**NO
INFLAMMABLE**

**NO
EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



- El myclobutanil es degradado en el suelo por acción de los microorganismos bajo condiciones aeróbicas.
- Se reporta como no persistente en la mayoría de texturas a excepción de un caso de suelo limoso, en el que se muestra persistente. Se comporta como una molécula móvil en suelo franco arcilloso y suelo arenoso, pero se muestra inmóvil en suelo franco limoso, franco arenoso y arcilloso.
- En el agua se comporta como no persistente; siendo la degradación microbiana la ruta más importante bajo condiciones aeróbicas.
- Es moderadamente tóxico para peces de agua fría como la trucha arco iris, es ligeramente tóxico para microcrustáceos (zooplancton) y moderadamente tóxico para algas verdes (fitoplancton), es levemente tóxico para aves.

- Peligroso para los organismos acuáticos
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Los envases no deben utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

- No almacenar o transportar con productos de consumo humano o animal.
- No almacenar en casas de habitación.
- El almacén debe ser exclusivo de tóxicos químicos; debe ser seco, ventilado, con el piso cubierto por un material impermeable.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

MYCLOMEX es un fungicida sistémico, rápidamente absorbido por el follaje y traslocado vía xilema, y que posee acción preventiva, curativa y erradicante.

MYCLOMEX es un fungicida perteneciente al grupo de los triazoles, que actúa interfiriendo e inhibiendo la síntesis del ergosterol, componente fundamental de las paredes celulares de los hongos que controla.

MYCLOMEX es un fungicida que pertenece al grupo de los triazoles y que es recomendado para el control de oidiosis en los cultivos de alcachofa, *Capsicum annuum* y vid.

Cultivo	Enfermedad		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/Ha	g/cil		
Alcachofa	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	-	100 - 150	3	0.5
<i>Capsicum annuum</i> (pimientos, p��prika, piquillo)	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	-	100 - 150	3	0.5
Vid	Oidiosis	<i>Uncinula necator</i>	200 - 300	-	14	1

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón.

Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

MYCLOMEX se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor.

No realizar más de 2 aplicaciones por campaña. El intervalo de aplicación es de 15 días o más.

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.
Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD. Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción alcalina, azufres y cobres. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD. MYCLOMEX no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

