

LEA DETENIDAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# MYCLOMEX®

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### POLVO MOJABLE - WP

#### COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Myclobutanil..... 400 g/kg  
Aditivos ..... 600 g/kg

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto puede ser mortal si se ingiere. Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles
- Teléfonos de emergencia: Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud: 117 (línea gratuita), CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita), CropCare: (01) 630-6420.
- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vómito, especialmente si el paciente está inconsciente.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, efectuar una limpieza con bastante agua, aplicada en los ojos en forma de chorro durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
- Nota al médico: no existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta.

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en suelos arenosos o en zonas con napas freáticas superficiales.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios indicados por las autoridades locales para este fin.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MYCLOMEX es un fungicida sistémico, rápidamente absorbido por el follaje y trasladado vía xilema, y que posee acción preventiva, curativa y erradicante. MYCLOMEX es un fungicida perteneciente al grupo de los triazoles, que actúa interfiriendo e inhibiendo la síntesis del ergosterol, componente fundamental de las paredes celulares de los hongos que controla. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO" CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/ha	g/cil		
ALCACHOFA	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	-	100 - 150	3	0,5
<i>Capiscum annuum</i> (pimientos, páprika, piquillo)	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	-	100 - 150	3	0,5
VID	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	200 - 300	-	14	1

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

No realizar más de 2 aplicaciones/campaña/año. El intervalo de aplicación es 15 días o más.

#### PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

#### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción alcalina, azufres y cobres. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

#### FITOTOXICIDAD

MYCLOMEX no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Titular del Registro: FARMEX S.A.  
Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
San Isidro, Lima 27 - PERU

Reg. PQUA N° 856-SENASA

CONTENIDO NETO:  
5 Kilogramos

Distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
San Isidro, Lima 27 - PERU  
Teléfono: (01) 630-6420 Fax: (01) 630-6410

Fabricado y Formulado por:  
JIANGSU FLAG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.  
No. 309, Changfenghe Road,  
Nanjing Chemical Industrial Park,  
Nanjing, China 2100047.

Lote N°:  
F. Fab. :  
F. Venc.:

Importado por: FARMEX S.A.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



UNIGRAF SAC