

NEOZEB[®] 80PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Mancozeb.....800 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Registro PQUA N° 171 - SENASA

Titular del Registro:

NEOAGRUM S.A.C.
Pj. Camino de Acceso N° 02 – Urb. Parcelación
Cajamarquilla, Lurigancho – Lima – Perú.



Importado y distribuido por:

GRUPO ANDEX S.A.C.
Av. Benavides 1579. 7mo piso. Of. 703.
Edificio del Park II. Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 253-6444



Contenido neto: 500 g
N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou
Zhejiang Province - CHINA

NO CORROSIVO



INFLAMABLE



EXPLOSIVO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Ditiocarbamato.**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión provocar el vómito, lavado gástrico, purgantes salinos y curas sintomáticas.
- Para la irritación de la piel: tratamientos genéricos de la dermatitis. Para la irritación ocular: pomadas o colonias oftálmicas.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0800-1-3040
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NEOZEB 80 PM es un fungicida polvo mojable de amplio espectro de acción que previene e inhibe infecciones causadas por hongos en plantas al proporcionar una capa protectora a los tejidos. Para preparar el caldo de aplicación llene el recipiente con agua hasta un tercio y agregue la dosis recomendada y agite hasta lograr una suspensión homogénea. Por último complete con agua el recipiente y continúe agitándolo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USO:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (g/200 L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Algodón	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	400-500	28	2
	Mancha carmelita	<i>Helminthosporium oryzae</i>	400-500	28	0.2
Arroz	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	600-800	28	0.1
	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	600	28	0.1
Mango	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	750	14	2
Naranja	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	400-500	28	5
Papa	Hielo fungoso o rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	400-500	28	0.2
	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria solani</i>	400-500	28	2
Pimiento	Mancha foliar	<i>Alternaria solani</i>	750	7	5
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	750	7	2
Tomate	Hielo fungoso o rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	400-500	10	2
	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria solani</i>	400-500	10	2.5
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	600	30	1.5

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña. El intervalo entre aplicaciones es de 7 a 14 días, variando de acuerdo al cultivo y a la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurridas 24 horas del tratamiento.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares de uso común, no mezclar con aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: NEOZEB 80 PM no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua, no menor de 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantener los animales fuera de la zona tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No usar el producto en suelos con capa freática superficial.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

