

PROYECTO DE ETIQUETA – Presentaciones de 1, 4, 20 & 200 L – Formulado en Perú

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Moderado irritante ocular.
- Este producto puede ser nocivo si se ingiere accidentalmente.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, guardar en un lugar fresco y seco.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: estrobilurinas y triazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión: No provocar vómito a menos que lo recomiende el médico, no dar nada por la boca a una persona inconsciente, obtener asistencia médica inmediata o trasladar al paciente a un Centro Médico.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua, retirar al paciente de la zona tratada.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con agua limpia y fresca durante 15 minutos. Consultar al oftalmólogo.
- En caso de inhalación: Retirar al afectado de la zona tratada, mantenerlo en reposo en un lugar ventilado, asistir con respiración artificial si fuera necesario. Consulte al médico.
- Teléfonos de Emergencia: Central de Urgencias y Emergencias de ESSALUD: 117 (línea gratuita), CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita) ó (01)328-7398, Farmex S.A.: (01) 630-6400.
- No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo cortándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al Centro de Acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Altamente tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, la fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y disponerlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.



TEBUSTROBIN

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA- SC

Composición Química:

Azoxystrobin..... 200 g/L
Tebuconazole..... 125 g/L
Aditivos c.s.p...1.0 L

Reg. N°

Titular del Registro:

FARMEX S.A.

Fabricado por:

Shanghai E-Tong Chemical Co., Ltd.

No. 23, Lane 5398, Shenzhuan Road, Song jiang District, Shanghai, China 201619.



Distribuido y formulado por:

FARMEX S.A.

Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7
San Isidro, Lima-Perú. Teléfono: 630-6400.

Contenido Neto:

1 Litro

N° de Lote :

Fecha de Fabricación :

Fecha de Vencimiento:

**NO
CORROSIVO**

**NO
INFLAMABLE**

**NO
EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO
- DAÑINO -**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TEBUSTROBIN es un fungicida con actividad protectante, curativa, erradicante, translaminar y sistémico que se recomienda en campos de *Capsicum annuum* para el control de la oidiosis *Leveillula taurica*.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

TEBUSTROBIN se aplica en pulverización empleando equipos terrestres tanto manuales como motorizados. Agitar fuertemente el envase antes de usarlo. Llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS:

Cultivo	Enfermedad		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	mL/cil	L/Ha		
<i>Capsicum annuum</i>	"oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	200	0.4	3	0,05

PC: período de carencia. LMR: límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Aplicar a la presencia de los primeros síntomas, en zonas endémicas aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realizar 2 aplicaciones por campaña. Intervalo de aplicación de 14 días.

PERÍODO DE REINGRESO:

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas a excepción de aquellos compuestos con reacción muy alcalina, además de ser incompatible con agentes fuertemente oxidantes y soluciones cáusticas fuertes.

FITOTOXICIDAD:

TEBUSTROBIN no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

