

27.50 centímetros

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Presenta ligera irritación al tracto respiratorio.
- Tóxico por ingestión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: triazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario. Consultar al médico.
- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vómito, especialmente si el paciente está inconsciente. Llevar al paciente al médico.
- **Teléfono de Emergencia: CISPROQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A.: (01) 630-6400.**
- Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestres. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Perseo®



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA FUNGICIDA AGRÍCOLA EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA - EW

COMPOSICIÓN:

Tebuconazole.....250 g/L
Aditivos.....c.s.p... 1.0 L

Reg. PQUA Nº 861 - SENASA

Titular del Registro:
FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU

Formulado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (511) 630-6400 Fax: (511) 630-6410
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 1L

Lote Nº :

F. Form. : “VER PARTE SUPERIOR”

F. Venc. :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

@marca registrada por FARMEX S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PERSEO® es un fungicida sistémico con acción protectora y curativa que se absorbe rápidamente a través de las hojas y actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol del hongo.

PERSEO® se absorbe rápidamente a través de las hojas y actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol del hongo.

PERSEO® se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/200L	L/ha		
Capsicum annum (pimiento, pprika, piquillo)	Oidiois	<i>Leveillulla taurica</i>	200 - 250	0.5 - 0.625	7	1
		<i>Cercosporiosis</i>	<i>Cercospora asparagi</i>	200 - 400		
Esprrago	Mancha prpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	200	0.5	40	0.05
		<i>Erysiphe necator</i>	100 - 500	0.4 - 0.6		

L.M.R.: Lmite mximo de residuos.

P.C.: Perodo de carencia (das).

FRECUENCIA Y POCA DE APLICACIN

No realizar ms de 2 aplicaciones por campaa/ao. El intervalo de aplicacin es de 15 das.

PERODO DE REINGRESO. No reingresar sin proteccin a un campo aplicado hasta 24 horas despus de la aplicacin. Mantener alejado al ganado durante este perodo.

COMPATIBILIDAD. Es compatible con la mayora de los plaguicidas comnmente usados a excepcin de los de reaccin alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclndolos en su debida proporcin en un envase pequeo.

FITOTOXICIDAD. **PERSEO®** no ha mostrado sntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado en los cultivos y a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las caractersticas fsicoqumicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqu recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

versin 01



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



0.50 centmetros

0.50 centmetros

2.10 centmetros
14.00 centmetros

0.20 centmetros

0.20 centmetros