

2.10 centímetros
14.00 centímetros

27.50 centímetros

0.20 centímetros

0.20 centímetros

Version 01

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Presenta ligera irritación al tracto respiratorio.
- Tóxico por ingestión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: triazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario. Consultar al médico.
- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vómito, especialmente si el paciente está inconsciente. Llevar al paciente al médico.
- **Teléfono de Emergencia: CISPROMQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A.: (01) 630-6400.**
- Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestres. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Perseo®



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA FUNGICIDA AGRÍCOLA EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA - EW

COMPOSICIÓN:

Tebuconazole.....250 g/L
Aditivos.....c.s.p... 1.0 L

Reg. PQUA Nº 861 - SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado por:
JIANGSU FLAG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
Changfeng Road, Nanjing Chemical Industrial Park, Luhe,
Nanjing, China.

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfono: (511) 630-6400 Fax: (511) 630-6410
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 1L

Lote Nº :

F. Form. : “VER PARTE
SUPERIOR”

F. Venc. :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

@marca registrada por FARMEX S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PERSEO® es un fungicida sistémico con acción protectora y curativa que se absorbe rápidamente a través de las hojas y actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol del hongo.

PERSEO® se absorbe rápidamente a través de las hojas y actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol del hongo.

PERSEO® se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/200L	L/ha		
Capsicum annum (pimiento, páprika, píquillo)	Oidiois	Leveillula taurica	200 - 250	0.5 - 0.625	7	1
Espárrago	Cercosporiosis	Cercospora asparagi	200 - 400	0.5 - 0.6	40	0.05
	Mancha púrpura	Stemphylium vesicarium	200	0.5		
Vid	Oidiois	Erysiphe necator	100 - 500	0.4 - 0.6	7	6

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

P.C.: Período de carencia (días).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

No realizar más de 2 aplicaciones por campaña/año. El intervalo de aplicación es de 15 días.

PERÍODO DE REINGRESO. No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD. Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD. **PERSEO®** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado en los cultivos y a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



0.50 centímetros

0.50 centímetros