

Curtine-V®

FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Cymoxanil..... 80 g/kg
Mancozeb..... 640 g/kg
Aditivos..... c.s.p. 1Kg

Registro N° 400-97-AG-SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@grupossilvestre.com.pe

Formulado por: NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.
9 Floor, No. 58, Nanhu Road, Nanjing 210017
China.

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **1 Kg**

F. de Form:
N° Lote:
F. de Venc:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

CURTINE-V® es un fungicida de baja toxicidad; sin embargo, durante su manejo se recomienda tomar las siguientes precauciones:

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón; y cambiarse de ropa.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y semillas.
- Transportar el producto protegido en un embalaje adecuado.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar en lugares frescos y bien ventilados.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico Cymoxanil: Cianoacetamida oxima
Grupo químico Mancozeb: Ditiocarbamatos

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)

Polvo Mojable (WP)

FUNGICIDA AGRICOLA

Curtine-V®

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CURTINE-V® es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos, mancozeb (fungicida de contacto) y cymoxanil (fungicida sistémico), que le brindan un efecto protector y curativo a la planta. Se recomienda usar CURTINE-V® para el control de enfermedades producidas por hongos oomicetos, siendo particularmente activo contra Phytophthora.

CURTINE-V® se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/cil 200 L	Kg/ha		
CEBOLLA	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	500	-	7	0.5
PAPA	"Ranchar"	<i>Phytophthora infestans</i>	500 - 750	-	15	0.5
PÁPRIKA	"Alternaria"	<i>Alternaria solani</i>	400 - 500	-	7	2
TOMATE	"Ranchar"	<i>Phytophthora infestans</i>	500	-	15	0.5
VID	"Mildiu"	<i>Plasmopora viticola</i>	-	2	10	0.2 cymoxanil 5.0 mancozeb

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de la enfermedad en el cultivo.

Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña. Hacer una segunda aplicación 5 - 7 días después de la primera.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresarse al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

CURTINE-V® es compatible con la mayoría de pesticidas de uso común, excepto con agentes oxidantes y ácidos. Se recomienda realizar una previa prueba en caso de no conocerse su compatibilidad con otro plaguicida.

FITOTOXICIDAD

CURTINE-V® no es fitotóxico a los cultivos si se aplica a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abejas.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

