

24,4 ± 0,5

# Curtine-V®

**FUNGICIDA AGRICOLA**
**Polvo Mojable (WP)**
**Composición Química:**

Cymoxanil..... 80 g/kg  
 Mancozeb..... 640 g/kg  
 Aditivos..... c.s.p. 1Kg

**Registro N° 400-97-AG-SENASA**

**Titular de Registro:** SILVESTRE PERÚ S.A.C.  
 Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.  
 Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312  
 Correo electrónico: sec@grupossilvestre.com.pe

**Formulado por:** PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD.  
 Changfenghe Road, Nanjing, Chemical Industrial  
 Park Luhe District, Nanjing, P.R. China.  
 Tel.: +91-11-41638091 Fax.: +91-11-41638097

**Importado y Distribuido por:** SILVESTRE PERÚ S.A.C.

 Contenido Neto: **1 Kg**

 F. de Form:  
 N° Lote:  
 F. de Venc:


NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**


14,6 ± 0,5

9,8 ± 0,5

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA  
 ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE,  
 FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

CURTINE-V® es un fungicida de baja toxicidad; sin embargo, durante su manejo se recomienda tomar las siguientes precauciones:

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón; y cambiarse de ropa.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y semillas.
- Transportar el producto protegido en un embalaje adecuado.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar en lugares frescos y bien ventilados.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico Cymoxanil: Cianoacetamida oxima  
 Grupo químico Mancozeb: Ditiocarbamatos
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
  - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
**CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398**  
**ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)**

Polvo Mojable (WP)

**FUNGICIDA AGRICOLA**

# Curtine-V®

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

CURTINE-V® es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos, mancozeb (fungicida de contacto) y cymoxanil (fungicida sistémico), que le brindan un efecto protector y curativo a la planta. Se recomienda usar CURTINE-V® para el control de enfermedades producidas por hongos oomicetos, siendo particularmente activo contra Phytophthora.

CURTINE-V® se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/cil 200 L	kg/ha		
CEBOLLA	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	500	-	7	0.5
PAPA	"Ranchar"	<i>Phytophthora infestans</i>	500 - 750	-	15	0.5
PÁPRIKA	"Alternaria"	<i>Alternaria solani</i>	400 - 500	-	7	2
TOMATE	"Ranchar"	<i>Phytophthora infestans</i>	500	-	15	0.5
VID	"Mildiu"	<i>Plasmopara viticola</i>	-	2	10	0.2 (a) 5 (b)

LMR: Límite Máximo de Residuos.

(a) Cymoxanil (b) Mancozeb

PC: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de la enfermedad en el cultivo.  
 Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña. Hacer una segunda aplicación 5 - 7 días después de la primera.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresarse al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

CURTINE-V® es compatible con la mayoría de pesticidas de uso común, excepto con agentes oxidantes, ácidos, alcalinos y cobre. Se recomienda realizar una previa prueba en caso de no conocerse su compatibilidad con otro plaguicida.

**FITOTOXICIDAD**

CURTINE-V® no es fitotóxico a los cultivos si se aplica a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físico- químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA  
 ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE,  
 FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abejas.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.