

24,4 ± 0,5

14,6 ± 0,5

9,8 ± 0,5

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**Curtine-V®**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

Polvo Mojable (WP)

Composición:

Cymoxanil : 80 g/kg  
Mancozeb : 640 g/kg  
Aditivos : c.s.p. 1 kg

Registro N° 400-97-AG-SENASA

Titular del Registro:  
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
Calle Arica 242 Miraflores.  
Lima 18 - Perú.  
Tel.: (01) 617-3300Importado y Distribuido por:  
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**Contenido Neto: **1 kg** (2 bolsas de 500 g)  
N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:Formulado por:  
**JIANGSU AIJIN  
AGROCHEMICAL CO., LTD.**  
No.58 Shuangxiang Road,  
Hongshan Fine-Chemical Zone,  
Nanjing 211511. China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE  
USAR EL PRODUCTO.  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y  
APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico:  
**Cymoxanil: Cianoacetamida oxima**  
**Mancozeb: Ditiocarbamatos**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106  
SILVESTRE PERU S.A.C.: (01) 617-3300

Polvo Mojable (WP)

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**Curtine-V®**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**CURTINE-V® 720 WP** es un fungicida de acción de contacto y translaminar, absorbido rápidamente por el follaje. Tiene un efecto curativo y actúa en la fase de incubación, previniendo daños en los cultivos. Contiene Cymoxanil, que controla el mildiú destruyendo esporas durante su germinación y limitando la formación de nuevas conidias, además de inhibir la división celular e interfiriendo con la síntesis de ARN. El mancozeb impide la actividad de enzimas sulfidrílicas, afectando la reproducción de ATP. Según el FRAC, **CURTINE-V® 720 WP** pertenece a los grupos Cianoacetamida oxime (Cymoxanil) y dithio carbamates (mancozeb).

**CURTINE-V® 720 WP** se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | ENFERMEDAD     |                               | DOSIS     |       | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm)    |
|---------|----------------|-------------------------------|-----------|-------|----------------|--------------------|
|         | NOMBRE COMÚN   | NOMBRE CIENTÍFICO             | g/200L    | kg/ha |                |                    |
| CEBOLLA | Mildiú         | <i>Peronospora destructor</i> | 500       | -     | 7              | 0.5                |
| PAPA    | Ranchar        | <i>Phytophthora infestans</i> | 500 - 750 | -     | 15             | 0.5                |
| PÁPRIKA | Tizón temprano | <i>Alternaria solani</i>      | 400 - 500 | -     | 7              | 2                  |
| TOMATE  | Ranchar        | <i>Phytophthora infestans</i> | 500       | -     | 15             | 0.5                |
| VID     | Mildiú         | <i>Plasmopora viticola</i>    | -         | 2     | 10             | 0.2 (a)<br>5.0 (b) |

P.C.: Período de Carencia (a) Cymoxanil (b) Mancozeb L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para el control de mildiú en cebolla, se aplicará por campaña de 3 a 5 aplicaciones y entre 9 a 15 aplicaciones al año (3 campañas). Para controlar el tizón temprano en ají paprika, por campaña se aplicará de 4 a 6 aplicaciones y de 8 a 12 aplicaciones al año (2 campañas). Para el control del mildiú en uva, se recomienda de 3 a 5 aplicaciones durante la campaña (1 campaña al año). Para el control de tizón tardío en papa, se recomienda entre 3 a 5 aplicaciones durante la campaña y de 6 a 10 aplicaciones al año (2 campañas). Para controlar el tizón tardío en tomate, se recomienda 1 a 2 aplicaciones por campaña y de 2 a 4 aplicaciones al año (2 campañas).

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresarse al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

**CURTINE-V®** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes, ácidos, alcalinos y cobre, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS"CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE  
DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.



Medidas en cm.

Caja de cartón

24,4 ± 0,5

14,6 ± 0,5

9,8 ± 0,5

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# Curtine-V®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

Polvo Mojable (WP)

Composición:

Cymoxanil : 80 g/kg  
Mancozeb : 640 g/kg  
Aditivos : c.s.p. 1 kg

Registro N° 400-97-AG-SENASA



**Titular del Registro:**  
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
Calle Arica 242 Miraflores.  
Lima 18 - Perú.  
Tel.: (01) 617-3300

**Importado y Distribuido por:**  
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

**Contenido Neto: 1 kg** (2 bolsas de 500 g)  
N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

**Formulado por:**  
**NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.**  
8 South Liyuan Road, Jiangning  
District, Nanjing, China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**


LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico:**  
**Cymoxanil: Cianoacetamida oxima**  
**Mancozeb: Ditiocarbamatos**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**SAMU: 106**  
**SILVESTRE PERU S.A.C.: (01) 617-3300**

Polvo Mojable (WP)

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

# Curtine-V®

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CURTINE-V® 720 WP** es un fungicida de acción de contacto y translaminar, absorbido rápidamente por el follaje. Tiene un efecto curativo y actúa en la fase de incubación, previniendo daños en los cultivos. Contiene Cymoxanil, que controla el mildiú destruyendo esporas durante su germinación y limitando la formación de nuevas conidias, además de inhibir la división celular e interfiriendo con la síntesis de ARN. El mancozeb impide la actividad de enzimas sulfidrilicas, afectando la reproducción de ATP. Según el FRAC, **CURTINE-V® 720 WP** pertenece a los grupos Cianoacetamida oxime (Cymoxanil) y dithio carbamates (mancozeb).

**CURTINE-V® 720 WP** se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | ENFERMEDAD     |                               | DOSIS     |       | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm)    |
|---------|----------------|-------------------------------|-----------|-------|----------------|--------------------|
|         | NOMBRE COMÚN   | NOMBRE CIENTÍFICO             | g/200L    | kg/ha |                |                    |
| CEBOLLA | Mildiú         | <i>Peronospora destructor</i> | 500       | -     | 7              | 0.5                |
| PAPA    | Rancho         | <i>Phytophthora infestans</i> | 500 - 750 | -     | 15             | 0.5                |
| PÁPRIKA | Tizón temprano | <i>Alternaria solani</i>      | 400 - 500 | -     | 7              | 2                  |
| TOMATE  | Rancho         | <i>Phytophthora infestans</i> | 500       | -     | 15             | 0.5                |
| VID     | Mildiú         | <i>Plasmopora viticola</i>    | -         | 2     | 10             | 0.2 (a)<br>5.0 (b) |

P.C.: Período de Carencia (a) Cymoxanil (b) Mancozeb L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Para el control de mildiú en cebolla, se aplicará por campaña de 3 a 5 aplicaciones y entre 9 a 15 aplicaciones al año (3 campañas). Para controlar el tizón temprano en ají paprika, por campaña se aplicará de 4 a 6 aplicaciones y de 8 a 12 aplicaciones al año (2 campañas). Para el control del mildiú en uva, se recomienda de 3 a 5 aplicaciones durante la campaña (1 campaña al año). Para el control de tizón tardío en papa, se recomienda entre 3 a 5 aplicaciones durante la campaña y de 6 a 10 aplicaciones al año (2 campañas). Para controlar el tizón tardío en tomate, se recomienda 1 a 2 aplicaciones por campaña y de 2 a 4 aplicaciones al año (2 campañas).

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresarse al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**CURTINE-V®** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes, ácidos, alcalinos y cobre, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.



Medidas en cm.

Caja de cartón

24,4 ± 0,5

14,6 ± 0,5

9,8 ± 0,5

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**Curtine-V®**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

Polvo Mojable (WP)

**Composición:**Cymoxanil : 80 g/kg  
Mancozeb : 640 g/kg  
Aditivos : c.s.p. 1 kg

Registro N° 400-97-AG-SENASA

**Titular del Registro:**  
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
Calle Arica 242 Miraflores.  
Lima 18 - Perú.  
Tel.: (01) 617-3300**Importado y Distribuido por:**  
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.****Contenido Neto: 1 kg** (2 bolsas de 500 g)  
N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:**Formulado por:**  
**PARIJAT INDUSTRIES**  
**(INDIA) PVT. LTD.**  
Changfenghe Road, Nanjing,  
Chemical Industrial Park Luhe District,  
Nanjing, P.R. China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico:**  
**Cymoxanil: Cianoacetamida oxima**  
**Mancozeb: Ditiocarbamatos**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:****SAMU: 106**  
**SILVESTRE PERU S.A.C.: (01) 617-3300**

Polvo Mojable (WP)

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**Curtine-V®**

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CURTINE-V® 720 WP** es un fungicida de acción de contacto y translaminar, absorbido rápidamente por el follaje. Tiene un efecto curativo y actúa en la fase de incubación, previniendo daños en los cultivos. Contiene Cymoxanil, que controla el mildiú destruyendo esporas durante su germinación y limitando la formación de nuevas conidias, además de inhibir la división celular e interfiriendo con la síntesis de ARN. El mancozeb impide la actividad de enzimas sulfidrilicas, afectando la reproducción de ATP. Según el FRAC, **CURTINE-V® 720 WP** pertenece a los grupos Cianoacetamida oxime (Cymoxanil) y dithio carbamates (mancozeb).

**CURTINE-V® 720 WP** se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | ENFERMEDAD     |                               | DOSIS     |       | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm)    |
|---------|----------------|-------------------------------|-----------|-------|----------------|--------------------|
|         | NOMBRE COMÚN   | NOMBRE CIENTÍFICO             | g/200L    | kg/ha |                |                    |
| CEBOLLA | Mildiú         | <i>Peronospora destructor</i> | 500       | -     | 7              | 0.5                |
| PAPA    | Rancho         | <i>Phytophthora infestans</i> | 500 - 750 | -     | 15             | 0.5                |
| PÁPRIKA | Tizón temprano | <i>Alternaria solani</i>      | 400 - 500 | -     | 7              | 2                  |
| TOMATE  | Rancho         | <i>Phytophthora infestans</i> | 500       | -     | 15             | 0.5                |
| VID     | Mildiú         | <i>Plasmopora viticola</i>    | -         | 2     | 10             | 0.2 (a)<br>5.0 (b) |

P.C.: Período de Carencia (a) Cymoxanil (b) Mancozeb L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Para el control de mildiú en cebolla, se aplicará por campaña de 3 a 5 aplicaciones y entre 9 a 15 aplicaciones al año (3 campañas). Para controlar el tizón temprano en ají paprika, por campaña se aplicará de 4 a 6 aplicaciones y de 8 a 12 aplicaciones al año (2 campañas). Para el control del mildiú en uva, se recomienda de 3 a 5 aplicaciones durante la campaña (1 campaña al año). Para el control de tizón tardío en papa, se recomienda entre 3 a 5 aplicaciones durante la campaña y de 6 a 10 aplicaciones al año (2 campañas). Para controlar el tizón tardío en tomate, se recomienda 1 a 2 aplicaciones por campaña y de 2 a 4 aplicaciones al año (2 campañas).

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresarse al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**CURTINE-V®** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes, ácidos, alcalinos y cobre, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.



Medidas en cm.

Caja de cartón

24,4 ± 0,5

14,6 ± 0,5

9,8 ± 0,5

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# Curtine-V®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

Polvo Mojable (WP)

**Composición:**

Cymoxanil : 80 g/kg  
Mancozeb : 640 g/kg  
Aditivos : c.s.p. 1 kg

Registro N° 400-97-AG-SENASA



**Titular del Registro:**  
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
Calle Arica 242 Miraflores.  
Lima 18 - Perú.  
Tel.: (01) 617-3300

**Importado y Distribuido por:**  
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

**Contenido Neto: 1 kg** (2 bolsas de 500 g)  
N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

**Formulado por:**  
**VAPCO**  
(VETERINARY AND AGRICULTURAL  
PRODUCTS MANUFACTURING CO. LTD.)  
P.O. Box 17058 Amman 11195. Jordania.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico:**  
**Cymoxanil: Cianoacetamida oxima**  
**Mancozeb: Ditiocarbamatos**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**SAMU: 106**  
**SILVESTRE PERU S.A.C.: (01) 617-3300**

Polvo Mojable (WP)  
**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

# Curtine-V®

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CURTINE-V® 720 WP** es un fungicida de acción de contacto y translaminar, absorbido rápidamente por el follaje. Tiene un efecto curativo y actúa en la fase de incubación, previniendo daños en los cultivos. Contiene Cymoxanil, que controla el mildiú destruyendo esporas durante su germinación y limitando la formación de nuevas conidias, además de inhibir la división celular e interfiriendo con la síntesis de ARN. El mancozeb impide la actividad de enzimas sulfidrilicas, afectando la reproducción de ATP. Según el FRAC, **CURTINE-V® 720 WP** pertenece a los grupos Cianoacetamida oxime (Cymoxanil) y dithio carbamates (mancozeb).

**CURTINE-V® 720 WP** se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | ENFERMEDAD     |                               | DOSIS     |       | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm)    |
|---------|----------------|-------------------------------|-----------|-------|----------------|--------------------|
|         | NOMBRE COMÚN   | NOMBRE CIENTÍFICO             | g/200L    | kg/ha |                |                    |
| CEBOLLA | Mildiú         | <i>Peronospora destructor</i> | 500       | -     | 7              | 0.5                |
| PAPA    | Ranchar        | <i>Phytophthora infestans</i> | 500 - 750 | -     | 15             | 0.5                |
| PÁPRIKA | Tizón temprano | <i>Alternaria solani</i>      | 400 - 500 | -     | 7              | 2                  |
| TOMATE  | Ranchar        | <i>Phytophthora infestans</i> | 500       | -     | 15             | 0.5                |
| VID     | Mildiú         | <i>Plasmopora viticola</i>    | -         | 2     | 10             | 0.2 (a)<br>5.0 (b) |

P.C.: Período de Carencia (a) Cymoxanil (b) Mancozeb L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Para el control de mildiú en cebolla, se aplicará por campaña de 3 a 5 aplicaciones y entre 9 a 15 aplicaciones al año (3 campañas). Para controlar el tizón temprano en ají paprika, por campaña se aplicará de 4 a 6 aplicaciones y de 8 a 12 aplicaciones al año (2 campañas). Para el control del mildiú en uva, se recomienda de 3 a 5 aplicaciones durante la campaña (1 campaña al año). Para el control de tizón tardío en papa, se recomienda entre 3 a 5 aplicaciones durante la campaña y de 6 a 10 aplicaciones al año (2 campañas). Para controlar el tizón tardío en tomate, se recomienda 1 a 2 aplicaciones por campaña y de 2 a 4 aplicaciones al año (2 campañas).

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresarse al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**CURTINE-V®** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes, ácidos, alcalinos y cobre, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.




LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.



Medidas en cm.

Caja de cartón