

28.7cm x 15cm

- LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Moderadamente tóxico a la piel
 - Utilizar el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
 - Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y ventilado. Nunca junto a alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
 - No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos

- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Benzoylurea.
 - En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar agua a la persona si está inconsciente.
 - En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 min.
 - En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación lleve al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
 - Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX 0-800-1-3040
POINT ANDINA S.A. (01) 348-1018
CISPROSQUIM 0800-50847
ESSALUD 107

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Realizar obligatoriamente el triple lavado.
- Después de usar el contenido enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación y luego destruya este envase y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u artrópodo benéfico.
- No aplicar en época de floración del cultivo, ni cuando se verifica la presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición Química:
Teflubenzuron 150 g
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N°

Titular de Registro:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto Mz A6, Lote 15
Urbanización Santa Patricia II Etapa.
La Molina. Lima- Perú
Tel: (01) 348-1018 /349 -9609

Formulado por:
POINT AGRO-CHINA LIMITED
Wan Shi Town,
Yixing, Jiangsu, 214217 China
Tel. (86-510)8785 1001, Fax. 8785 1537

Importado y Distribuido por:
POINT ANDINA S.A.

Contenido Neto: **1 L**
N° Lote:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INDICATIVOS DE USO Y MANEJO
MERCURY 150 SC es un insecticida regulador del crecimiento. Actúa mediante la inhibición de la síntesis de quitina y la muda, impidiendo el depósito de quitina en la cutícula del insecto después de la ingestión. Puede afectar la fertilidad de los insectos hembras después del contacto o ingestión.

MERCURY 150 SC se aplica mezclando la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada, buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L / cilindro 200 L		
TOMATE	Gusano del fruto	Spodoptera eridania	0.10 - 0.15	9	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos
P.C.: Periodo de Carencia

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Aplicar cuando se observen larvas de los primeros estadios (L1, L2), con un promedio de 2 larvas/planta
- Máximo realizar 2 aplicaciones, (con un intervalo de 8-10 días); considerando 2 campañas/año.
- De persistir la plaga, usar otro insecticida de diferente mecanismo de acción para evitar resistencia.
- Usar la mayor dosis en ataques severos de la plaga.
- La dosis máxima a aplicar es de 0.45 L/ha.

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al área tratada, 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con todos los productos agrícolas.

FITOTOXICIDAD
No se presenta riesgos de fitotoxicidad, si se aplica en los momentos y a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

