

DK-ZATE

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Cymoxanil.....	80 g/kg.
Mancozeb.....	640 g/kg.
Aditivos.....	280 g/kg.

Reg. PQUA N° 037-SENASA

CONTENIDO NETO: 25 Kg

Número de Lote	:
Fecha de Formulación	:
Fecha de Vencimiento	:

TITULAR DEL REGISTRO: **DROKASA PERÚ S.A.**

Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar

Teléfono: 501-1000 / Fax: 262-8403

FORMULADO POR:

ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD.

Sofia 1000, Solunska Str. 58 B, FL. 1

Apt. 1. Bulgaria.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- “Este producto es nocivo si se ingiere”
- “Este producto puede causar sensibilización por contacto con la piel”
- “Este producto es irritante para el sistema respiratorio”
- “No respire el polvo”
- “El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas”
- “Evite contacto con la piel y ropa”
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- El producto no puede ser usado por personas que mantengan un tratamiento por epilepsia, especialmente fenobarbital.
- El producto no puede ser usado por personas que tengan problemas de tiroides o estén bajo tratamiento de afecciones tiroideas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico Mancozeb: Ditiocarbamato
- Grupo químico Cymoxanil: Acetamida
- En caso de intoxicación llame a un médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- **En caso de EMERGENCIAS llamar a:**
CICOTOX Telf.: 0 800-13040 (Atención 24 horas) ó
ESSALUD Telf.:423-7600
- NOTA AL MÉDICO: en caso de ingestión efectuar un lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.
- Se recomienda que en caso de uso prolongado y continuo, efectuar evaluación de tiroides.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No disponer los envases con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

“Peligroso para los organismos acuáticos, no contamine fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes y envases vacíos del producto”.

“En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin”.

“No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos”.

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

DK-ZATE, combina la acción de un fungicida sistémico y uno de contacto. El ingrediente activo Cymoxanil tiene acción sistémica en las plantas y el Mancozeb es un ingrediente activo con acción de contacto. El producto presenta efectos curativos y preventivos. El efecto curativo se manifiesta cuando el tratamiento es realizado 24-48 horas después de la infección. Es usado para prevenir el ataque de *Phytophthora infestans* en el cultivo de papa.

DK-ZATE, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con mochila manual.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

DK-ZATE, es utilizado cuando se presentan las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad o después de la primera manifestación de la enfermedad. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones / campaña, en periodos de 7-14 días, dependiendo de las condiciones climáticas y del estado fenológico del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta **24** horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD

DK-ZATE, es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola y fertilizantes foliares excepto aquellos de reacción alcalina. Antes de preparar la mezcla se recomienda consultar con un especialista.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS kg/ha	PC Días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa	“Hielo o Ranca”	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0 - 3.0	15	0.5
Cebolla	Mildiu de la cebolla	<i>Peronospora destructor</i>	2.0 - 3.0	8	0.05
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	2.0 - 2.5	28	0.05* - 5**

LMR: Límite máximo de residuos (*Cimoxanil, **Mancozeb)

PC: Período de carencia

La dosis mínima corresponde a aplicaciones preventivas en plantas tiernas. En plantas desarrolladas y cuando la presión de la enfermedad es alta, usar las dosis altas.

