

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- PRIMEROS AUXILIOS:**

CICOTOX, Telef.: 328-7398
ESSALUD, Telef.: 0801-10200
ITAGRO S.A., (01) 349-6805.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

-

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- # Itadate

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición:

Oxamyl	240 g/L
Aditivos csp	1 L

Registro PQUA N° 813-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: ITAGRO S.A.
Fabricante y Formulator: Rayfull Holding Co. Ltd.
 Room 601, 3A Daziran City Light Bldg
 Wenzhou Zhejiang - China.
 Telef. +86-577-88905587

Importador y Distribuidor:



INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.
Av. Los Ingenieros N° 230 - La Molina
Telefax: (511) 349-6805
itagro@peru.com

Contenido neto	: 1 L
Lote N°	:
Fecha de formulación	:
Fecha de vencimiento	:

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

GENERALIDADES:

ITADATE, es un insecticida - nematicida; neonicotinoide a base de Oxamyl, con acción de contacto y sistémica

INDICATIVOS DE USO:

Antes de aplicar asegúrese de que el equipo de aplicación este en buenas condiciones de uso y calibrado. Este producto se puede aplicar con equipo terrestre o aéreo. El equipo terrestre que se utiliza es equipo manual, equipo mecánico y equipo motorizado (eléctrico, baterías). deben usarse boquillas de cono hueco o de cono lleno debido a la mejor penetración del producto sobre la superficie.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Llenar el recipiente con agua hasta la mitad, agregar la dosis de producto, termine de llenar con agua y agítese bien la mezcla hasta hacerla homogénea. Mezclar únicamente la cantidad de producto, que se vaya a utilizar inmediatamente, tapando muy bien el recipiente con el producto sobrante. Es importante y necesario lavar el equipo luego de terminada la aplicación y darle el mantenimiento adecuado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	UAC (DÍAS)	L M R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	Dosis / Cil. 200L (L/l)		
Papa	Meloidogyne	Meloidogyne incognita	1.5 - 2	7	0.1

LMR = Limite Máximo de Resíduos

UAC = Última Aplicación antes de las Cosechas

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Las aplicaciones deben basarse en evaluaciones hechas en campo, teniendo en cuenta el nivel de daño económico en el cultivo y densidad de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al área tratada por lo menos 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

ITADATE es compatible con la mayoría de plaguicidas, incluyendo aceites agrícolas, pero se debe evitar la mezcla con plaguicidas altamente alcalinos. **ITADATE** no es fitotóxico aplicado en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

