

Ancho 35 cms.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO YAPLICACION

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Ditiocarbamatos

En caso de ingestión, dé a beber 2 vasos de agua.

En caso de contacto del producto con los ojos lavarse con abundante agua durante 15 minutos y si el contacto fuera con la piel, lavarse con agua y jabón.

En caso de emergencia llamar a CICOTOX 0800-13-040, CISPROQUIM 0800-50-847 ó AlóEsSalud 0801-10-200

NOTA AL MEDICO: El tratamiento es sintomático. No existe antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

Después de usar el contenido destruya este envase y depositelo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantener a los animales fuera del área tratada.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

Curathane®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable - WP

Composición:

Mancozeb 640 g/kg
 Cymoxanil 80 g/kg
 Aditivos c.s.p 1 kg

Registro N° 350-97-AG-SENASA

Titular del Registro: Dow Perú S.A.

Arias Araguez 250, Lima 18 - Perú. Telf.: 208 4700



FABRICADO Y FORMULADO POR:
 Dow AgroSciences de Colombia S.A.
 Transversal 18 N° 96-41 Piso 7°
 Bogotá - Colombia



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
 Aris Industrial S.A.
 Av. Industrial 491
 Telf.: (51-1) 3365428
 Lima 1 - Perú

Contenido Neto: 500 g

Lote No.

Fecha de Fabricación:

Fecha de Expiración:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada de Dow AgroSciences LLC

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CURATHANE® es un fungicida con acción preventiva y de post-infección cuando el hongo está en incubación. Además, posee actividad sistémica local, lo cual mejora su efecto especialmente en periodos de alta presión de la enfermedad. Su forma de empleo es en aspersión foliar ó mezclado con la semilla en arroz.

Preparación: Disuelva completamente la cantidad de Curathane a usar en un balde y luego depositelo en el tanque de mezcla que contenga agua hasta ¾ o la mitad, complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla cada vez que vaya a llenar el equipo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS / g/200 L	PC (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Agente causal			
Papa	Hielo o rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	500 - 1000 g/200 L agua	8	0.05
Tomate	Hielo fungoso	<i>Phytophthora infestans</i>	500 - 1000 g/200 L agua	8	0.05
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	750	7	Mancozeb: 7 Cymoxanil : 0.10

Impregnación de semillas

Arroz	"Quemado"	<i>Pyricularia oryzae</i>	2 g/kg semilla
	"Manchado de la semilla"	<i>Helminthosporium sp.</i> <i>Alternaria sp.</i> <i>Nigrospora sp.</i> <i>Curvularia sp.</i>	

*L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

En el cultivo de arroz, se hace una única aplicación (impregnación) de la semilla antes de la siembra • En el cultivo de papa, se harán no más de 4 aplicaciones por campaña, siendo lo más común dos aplicaciones como máximo. Las aplicaciones se harán hasta un mes antes de la cosecha, con un intervalo no menor de tres semanas entre una aplicación y otra, alternándose de preferencia con fungicidas de diferente modo de acción • En tomate, no se excederán de cuatro aplicaciones/campaña, siendo una aplicación lo más frecuente, alternada también con el uso de fungicidas de diferente modo de acción. Es más frecuente su uso durante el llenado y la maduración del fruto.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda esperar 24 horas después de la aplicación para reingresar a un campo tratado.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los plaguicidas de uso en el mercado. Si el producto acompañante de la mezcla aumenta el pH del agua por encima de 8.5, entonces la fracción correspondiente al cymoxanil sufre degradación. En el caso de que se desconozca la compatibilidad hay necesidad de hacer una prueba previa de su uso.

FITOTOXICIDAD: No produce fitotoxicidad cuando se usa según las recomendaciones aquí dadas.

Responsabilidad civil: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

