

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el maneo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Nimbiol 0.1% CE no es tóxico vía oral y dermal, sin embargo siendo una sustancia de origen orgánica se recomienda en caso de ingestión inducir al vómito y consultar al médico. Así mismo se recomienda remover a la persona del área contaminada, retirar ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Nota al médico: Antídoto.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106;

POINT ANDINA S.A.: (01) 348 1018; CISPROQUIM: 0800-50847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositar en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Nimbiol®
0.1% CE

EXTRACTO VEGETAL

INSECTICIDA – FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Aceite de Neem 99.90 %
 Azadirachtina 0.10 %

Reg. PBUA N° 113-SENASA

Titular del registro: POINT ANDINA S.A.

Importado y distribuido por:
POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147, Oficina 701-B.
 Santiago de Surco, Lima – Perú.
 Teléfono +51 (01) 348-1018 / 349-9609

Formulado por:
FORTUNE BIOTECH LTD.

6-6-125 Annam gardens, Kavdiguda
 Secunderabad - 500 380, A.P. India
 Tel. 2753 4867, 2753 1888

Contenido Neto: 500 ml

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

NIMBIOL 0.1% CE es un insecticida y fungicida biológico extraído de las semillas del árbol tropical del Neem Azadirachtia indica, está compuesto por una mezcla de más de 100 terpenoides, el más activo es la azadiractina.

NIMBIOL 0.1% CE como insecticida actúa por contacto, es letal para huevos y ninfas de Bemisia tabaci, actúa como un inhibidor de la alimentación y tiene acción repelente. Como fungicida actúa de manera preventiva y curativa a inicios de la infestación. En almacén, conserve a temperaturas mayores a 15°C, evite mantener stocks en lugares fríos.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Para una adecuada aplicación, llenar hasta la mitad del tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------|--------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | L/ha | L/200L | | |
| Araucario | Mosca Blanca | <i>Aleurodicus julei</i> | 3.0 - 4.0 | - | N.A. | N.A. |
| Café | Roya del cafeito | <i>Hemileia vastatrix</i> | - | 0.5 - 1.0 | N.A. | N.A. |
| Mandarina | Minador de la hoja | <i>Phyllocnistis citrella</i> | - | 1.0 | N.A. | N.A. |
| Tomate | Mosca blanca | <i>Bemisia tabaci</i> | - | *1.5 | N.A. | N.A. |
| Vid | Oidiosis | <i>Uncinula peruviana</i> | - | 0.5 - 1 | N.A. | N.A. |
| Alcachofa | Mosca lagunar | <i>Amauromyza maculosa</i> | - | 0.5 | N.A. | N.A. |

PC: Período de carencia

N.A.: No aplica

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón)

* Volumen de gasto de agua: 400 L/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar al inicio de la infestación de la plaga, la frecuencia será de acuerdo a las recomendaciones del asesor técnico. No aplicar en la presencia de lluvias o con temperaturas altas. Es mejor realizar las aplicaciones por las tardes. Guardar el producto en un lugar fresco y seco. Evitar la exposición directa al sol y a altas temperaturas.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar a las áreas tratadas durante una hora después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: NIMBIOL 0.1 % CE es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. No se recomienda usar con azufre ni cobre. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad física antes de mezclar con diferentes productos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



Point
 ENTREGAMOS CALIDAD



PRECAUCIÓN

