

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el maneo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Inimbiol 0.1% CE no es tóxico vía oral y dermal, sin embargo siendo una sustancia de origen orgánica se recomienda en caso de ingestión inducir al vómito y consultar al médico. Así mismo se recomienda remover a la persona del área contaminada, retirar ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Nota al médico: Antídoto.

**TÉLFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106;**

**POINT ANDINA S.A.: (01) 348 1018; CISPROQUIM: 0800-50847**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositar en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**Nimbiol®**  
 0.1% CE

EXTRACTO VEGETAL

INSECTICIDA – FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**COMPOSICIÓN:**

Aceite de Neem ..... 99.90 %  
 Azadirachtina ..... 0.10 %

Reg. PBUA N° 113-SENASA

Titular del registro: POINT ANDINA S.A.

Importado y distribuido por:  
**POINT ANDINA S.A.**  
 Calle Los Tulipanes 147, Oficina 701-B.  
 Santiago de Surco, Lima – Perú.  
 Teléfono +51 (01) 348-1018 / 349-9609

Formulado por:  
**POINT INTERNATIONAL LTD.**  
 42 St Margarets Grove Twickenham  
 TW 1 1JG United Kingdom Teléfono:  
 (44-20) 88923862



**Point**  
 ENTREGAMOS CALIDAD

**Contenido Neto: 500 ml**

N° de Lote:  
 Fecha de Formulación:  
 Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**NIMBIOL 0.1% CE** es un insecticida y fungicida biológico extraído de las semillas del árbol tropical del Neem Azadirachtia indica, está compuesto por una mezcla de más de 100 terpenoides, el más activo es la azadiractina.

**NIMBIOL 0.1% CE** como insecticida actúa por contacto, es letal para huevos y ninfas de Bemisia tabaci, actúa como un inhibidor de la alimentación y tiene acción repelente. Como fungicida actúa de manera preventiva y curativa a inicios de la infestación. En almacén, conserve a temperaturas mayores a 15°C, evite mantener stocks en lugares fríos.

**SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

Para una adecuada aplicación, llenar hasta la mitad del tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/200L		
Arañazo	Mosca Blanca	<i>Aleurodicus julitkai</i>	3.0 - 4.0	-	N.A.	N.A.
Café	Roya del caféto	<i>Hemileia vastatrix</i>	-	0.5 - 1.0	N.A.	N.A.
Mandarina	Minador de la hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	-	1.0	N.A.	N.A.
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	-	*1.5	N.A.	N.A.
Vid	Oldiosis	<i>Uncinula peruviana</i>	-	0.5 - 1	N.A.	N.A.
Alcachofa	Mosca lagunar	<i>Arnauromyza maculosa</i>	-	0.5	N.A.	N.A.
Mango	Thrips	<i>Frankliniella occidentalis</i>	-	0.4	N.A.	N.A.

PC: Período de carencia      N.A.: No aplica  
 LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón)      \* Volumen de gasto de agua: 400 L/ha

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar al inicio de la infestación de la plaga, la frecuencia será de acuerdo a las recomendaciones del asesor técnico. No aplicar en la presencia de lluvias o con temperaturas altas. Es mejor realizar las aplicaciones por las tardes. Guardar el producto en un lugar fresco y seco. Evitar la exposición directa al sol y a altas temperaturas.

**PERÍODO DE REINGRESO:** No ingresar a las áreas tratadas durante una hora después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** NIMBIOL 0.1 % CE es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. No se recomienda usar con azufre ni cobre. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad física antes de mezclar con diferentes productos.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**PRECAUCIÓN**

