CAPEAGRO

Supertrobin® 500 WG

(Azoxystrobin)

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos Dispersables (WG)

CAPEAGRO

Supertrobin® 500 WG

(Azoxystrobin)

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Granulos Dispersables (WG)

Supertrobin® 500 WG

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRANULO DISPERSABLE (WG)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Azoxystrobin ..... 500 g/Kg
Aditivos de formulación ..... c.s.p. 1 Kg

Número de Registro: PQUA Nº 884 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

CAPEAGRO

Av. Jose Pardo 620 Of. 409
Miraflores - Lima

FORMULADO POR:

Oasis AgroScience Co., Ltd

Room 1512, NO.100, Jinjiang RD.
Shanghai, China

Importador y Distribuidor: **CAPEAGRO S.A.C.**

Nº de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: **25 Sobres de 40 g c/u**

NO INFLAMABLE **NO EXPLOSIVO** **NO CORROSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

CAPEAGRO

Supertrobin® 500 WG

(Azoxystrobin)

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos Dispersables (WG)

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA LA ETIQUETA EN SU TOTALIDAD
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos (causa enrojecimiento y picazón).
Durante la manipulación y aplicación del producto usar ropa protectora, delantal impermeable, guantes, botas, mascarilla o tapaboca, y para reingresar al área tratada..
No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.
No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
Después de usar el producto cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco alejado del calor y bajo llave.
No almacenar este producto en casas de habitación.

PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo Químico: ESTROBILURINAS
En caso de contacto con la piel: Quitar rápidamente la ropa contaminada. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
En caso de contacto ocular: Inmediatamente lavar con grandes cantidades de agua durante15 minutos como mínimo, manteniendo los párpados abiertos. Consultar al médico (oftalmólogo).
En caso de inhalación: Remover a la persona afectada al aire libre. Monitorear la dificultad respiratoria. Avisar al personal médico.
En caso de ingestión: No inducir al vómito o dar algo por la boca a una persona inconsciente. No dejar a la víctima desatendida. Llevar inmediatamente para la atención médica.
Tratamiento: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

EMERGENCIAS: Llamar a CAPEAGRO S.A.C. Telf.: (511) 445-5346. CICOTOX: 328-7398 Anx. 4814. CETOX: 213-2318

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido destruya el envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrante del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

CONDICIONES DE USO Y MANEJO
SUPERTROBIN 500 WG es un fungicida de acción preventivo y curativo.

Modo de preparación: Vierta la dosis del producto en la mitad de la cantidad de agua a aplicar, mezcle el producto agitando y luego agregue el resto del agua hasta completar la cantidad requerida.

CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico	kg/200L de agua	kg/ha		
Vid	"Oidiosis"	*Erysiphe necator*	0.1	0.2	14	2

* PC: Periodo de Carencia.
**LMR: Límite Máximo de Residuos.

Frecuencia y Momento de Aplicación: Aplicar **SUPERTROBIN 500 WG** (Azoxystrobin) máximo 1 aplicación por campaña/año, cuando se observe la presencia de la enfermedad.

Periodo de Reingreso: Se puede ingresar al área tratada después de 24 horas.

Compatibilidad: Si se desea hacer mezclas específicas en tanque es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad. No mezclar con aceites de uso vegetal, con concentrados emulsionables e insecticidas órgano fosforados.

Fitotoxicidad: En los diferentes ensayos de campo realizados con la sustancia activa no se han detectados respuestas fitotóxicas a las dosis recomendadas de aplicación. Por lo tanto no son de esperar reacciones fitotóxicas derivadas de la aplicación del producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

CAPEAGRO

Supertrobin® 500 WG

(Azoxystrobin)

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos Dispersables (WG)