

# Forum 500 WP

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE WP

**COMPOSICIÓN:**

Dimethomorph..... 500 g/kg

Aditivos..... c.s.p. 1 kg

**PQUA No 112 - SENASA**



The Chemical Company

**TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y**

**DISTRIBUIDO POR:**

BASF Peruana S.A.  
Av. O. R. Benavides 5915 – Callao  
Casilla 3911, Lima 100  
Telf: (01) 513 2500  
Fax: (01) 513 2519

**FORMULADO POR:**

BASF S.A.  
Av. Brasil, 791  
Bairro Eng. Neiva  
Guaratinguetá -São Paulo,  
Brasil

**CONTENIDO NETO: 90 g**

**N° de Lote:**

**Fecha Formulación:**

**Fecha de Vencimiento:**

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

®Marca Registrada BASF

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE  
LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa utilizada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación llame inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de inhalación: Conducir a la víctima hacia un lugar con aire fresco. Buscar atención médica.
- En caso de contacto con los ojos: No usar colirio. Buscar atención médica. Lavar con abundante agua corriente durante al menos 15 minutos y con los párpados abiertos.
- En caso de contacto con la piel: Lavarse con abundante agua y jabón durante 5 minutos.
- En caso de ingestión: No provocar el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.

Indicaciones para el médico:

- De acuerdo con los síntomas recurrir al tratamiento sintomático.

**TELEFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS  
CICOTOX : 0800-1-3040 (línea gratuita)  
BASF Peruana SA: 513 2505**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE**

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 15 metros.
- El aplicador deberá de emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No permitir animales en el área tratada.



**INSTRUCCIONES DE USO**

Forum 500 WP (dimethomorph) del grupo químico de las morfolinás, actúa impidiendo la formación de la pared celular de hongos oomicetos como la rancha o hielo y el mildiu. Forum 500 WP tienen acción translaminar (pasa de un lado a otro de las hojas) y sistémica hacia las partes superiores de la planta (brotes).

No aplicar Forum 500 WP solo sino en mezcla con fungicidas de contacto como metiram, mancozeb, chlorotalonil, etc. Se puede aplicar con pulverizadores de mochila, motopulverizadoras o equipos accionados por tractores. Tome un recipiente pequeño y prepare una premezcla con agua, Forum 500 WP y el fungicida acompañante. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la premezcla, y por último llene el tanque agitando constantemente.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO  
CUADRO DE USO**

Cultivo	Enfermedad		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	g/200 L		
Papa	Rancha o hielo	<i>Phytophthora infestans</i>	0.36-	150-	14	0.15
			0.40	200		
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.36-	150-	14	2.00
			0.40	200		

**FRECUENCIA DE LA APLICACIÓN Y EPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar Forum 500 WP en forma preventiva ante condiciones medioambientales favorables para el desarrollo del hongo o ante la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o cuando se conozca la susceptibilidad de las variedades cultivadas. Las aplicaciones deben de formar parte de un manejo integrado del cultivo. Se recomienda realizar hasta 2 aplicaciones con intervalos de 10 a 14 días, hacer rotaciones con productos sistémicos de diferente modo de acción y diferente grupo químico para evitar la aparición de la resistencia del hongo.

**PERIODO DE REINGRESO**

12 horas después de realizada la aplicación

**COMPATIBILIDAD**

Forum 500 WP se puede mezclar con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de usar en campo definitivo.

**FITOTOXICIDAD**

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis indicada en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”

