

Hierba Stop®

40 SC

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

Composición Química:

Bispiribac sodio.....400 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° - SENASA


Grupo Químico : Pirimidiniloxibenzoico

Nombre Químico : Sodio 2,6-bis[4,6-dimetoxi-2-pirimidinil]oxibenzoato.

Formula Empírica: C₁₈H₁₇N₃NaO₅

Peso Molecular : 452.36 g/mol

Formula Estructural:



NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico:Líquido

Color: blanquesino

Olor: prácticamente sin olor

pH: 9 - 9.1

Densidad: 1.16-1.17 g/ml a 20°C

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

Contenido neto : **250cc**

N° de lote:

Fecha de formulación :

Fecha de Vencimiento :

TITULAR DE REGISTRO

POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto Mz A-6 Lote 15

Urb. Sta Patricia - La Molina. Lima - Perú

Telf: (01) 348 - 1018/ (01) 349 - 9609

FABRICADO Y FORMULADO

POINT AGRO-CHINA LIMITED

Wan Shi Town,

Yixing, Jiangsu, 214217 China

Tel. (86-510) 8785 1001, Fax. 8785 1537

Distribuidor por:

POINT ANDINA S.A.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.

- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Pirimidiniloxibenzoico.

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.

- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.

- En caso de ingestión, si el paciente está consciente, lavar la boca y dar a beber abundante agua. No inducir al vómito ni administrar nada por la boca si la persona está inconsciente. Contactar a un médico.

- En caso de inhalación, traslade al paciente a un lugar fresco y bien ventilado y mantenerlo en reposo.

- Nota al médico: No se ha determinado antídoto específico. Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

En caso de emergencias llamar a

CICOTOX: 0800-1-3040; POINTANDINA S.A. (01) 348-1018;
CIPROSQUIM. 0800-5-0847 y ESSALUD: 107 ó 0801-10200

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones del producto.

- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.

- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.

- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.

- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar el área tratada en las primeras 24 horas.

- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **HIERBA STOP 40 SC** es un herbicida postemergente perteneciente al grupo de los Pirimidiniloxibenzoico, el cual se trasloca en el interior de las malezas inhibiendo la síntesis de aminoácidos, por lo que inhibe su crecimiento y causa la muerte.

- **HIERBA STOP 40 SC** se recomienda para el control de malezas gramíneas anuales, ciperáceas y de hoja ancha en el cultivo del arroz; tiene un largo poder residual.

- **HIERBA STOP 40 SC** se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

- **HIERBA STOP 40 SC** se aplica con un equipo aspersor mochila manual o con aspersores montados en tractor. En ambos casos, deben estar provistos de una boquilla tipo abanico plano.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

HIERBA STOP 40 SC es un herbicida cuya aplicación se realiza en la época de crecimiento vegetativo del arroz y post emergente a las malezas. Se efectúa una sola aplicación del producto/campaña.

PERIODO DE REINGRESO

Se puede reingresar el área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

HIERBA STOP 40 SC es compatible con la mayoría de herbicidas de uso común excepto los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos cuando es usado según se recomienda.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	MALEZA		DOSIS L/Ha	Periodo de carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
ARROZ	Canastilla	<i>Cyperus difformis</i>	0.1	---	0.02
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>			
	Correhuela	<i>Ipomoea sp.</i>			
	Florcita, botoncito	<i>Eclipta alba</i>			
	Grama lefe	<i>Echinochloa colonum</i>			
	Leche Leche	<i>Euphorbia hirta</i>			
	Moco de pavo	<i>Echinochloa crusgalli</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Yuyo hembra	<i>Amaranthus hybridus</i>			
	Yuyo macho	<i>Amaranthus spinosus</i>			

LMR: Límite Máximo de Residuos.

