

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

HELIOS[®]

76% PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - (WP)

COMPOSICIÓN:

Propineb	700 g/Kg
Cymoxanil	60 g/Kg
Aditivos	c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N° 897 - SENASA



Titular del registro: POINT ANDINA S.A.

Importado y distribuido por:

POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.

Santiago de Surco, Lima – Perú.

Teléfono +51 (01) 348 1018

Formulado por:

POINT AGRO-CHINA Ltd

Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu, 214217 China

Tel. (86-510)8785 1001

Contenido Neto: 500g

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Acetamida y Ditiocarbamato

- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar de beber agua a la persona si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos con agua limpia durante 15 minutos. Lleve al paciente al oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 20 minutos.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario. Lleve al paciente inmediatamente al médico.
- No tiene antídoto, dar tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

POINT ANDINA S.A.: (01) 348 1018

SAMU: 106; CICOTOX: (511) 619-7000 Anexo:4836-4837,

Línea directa: 956740369

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas de napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en un lugar seguro, a fin de evitar su lixiviación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

HELIOS 76% PM, es un fungicida de acción preventiva y curativa, que combina las sustancias activas: Cymoxanil de acción sistémica que impide el crecimiento del hongo a través de la inhibición del desarrollo de los haustorios; y propineb con acción de contacto y efecto multisitio que afecta diversos procesos metabólicos deteniendo el desarrollo del hongo.

HELIOS 76% PM, se emplea diluido en agua, preparar una premezcla, diluyendo la cantidad necesaria en un balde, luego vaciar en el recipiente definitivo completando la cantidad de agua requerida. Aplicar al follaje empleando cualquier tipo de equipo convencional terrestre en perfecto estado y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda, utilizar el producto cuando se presente las condiciones favorables para el desarrollo del hongo. Estas condiciones dependerán del historial de campo.

Usar la dosis más alta en ataques severos.

Aplicar máximo 2 veces por campaña, solo cuando sea necesario y considerando como máximo 1 campaña al año.

En caso se requiera otra aplicación, rotar con otros productos de diferente modo de acción. Como máximo aplicar 1.5 kg/ha.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

HELIOS 76% PM es compatible con la gran mayoría de los pesticidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/200 L	PC (días)	LMR (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			Propineb	Cymoxanil
Papa	Hielo (rancha)	<i>Phytophthora infestans</i>	0.5 - 0.6	14	0.1	0.05
Vid	Mildiú	<i>Plasmopara viticola</i>	0.5	21	0.05	0.05
Cebolla	Mildiú	<i>Peronospora destructor</i>	0.5	14	0.05	0.05

P.C.: Período de Carencia. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón).

