

Tamaño de letra: 8 puntos

Tamaño de letra: 7,5 puntos

Tamaño de letra: 7 puntos

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: *Este producto es tóxico si se ingiere. *Este producto causa irritación ocular moderada. *Dañino si se absorbe a través de la piel. *Dañino si se inhala. Evite respirar el vapor, polvo o aspersión. *Evite el contacto de este producto con la piel, los ojos y la ropa. *Lávese con agua y jabón después de manipular el producto. *No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. *Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. *No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases. *Manténgase alejado del fuego y las chispas. *Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. *Remueva la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. *Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación. *Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. *No almacenar en casa de habitación. *No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. *Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS: Grupo Químico: Oxadiazine. En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los primeros cinco minutos, luego continúe lavando los ojos. Consulte a un médico. En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte a un médico. En caso de inhalación, lleve al paciente a un lugar aireado, lejos del sitio de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Consulte al médico. En caso de ingestión, inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Sumínistrela al paciente un vaso con agua si puede beberlo. No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. ANTI-DOTO: No existe un antídoto específico. Su tratamiento es sintomático. En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela esta etiqueta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CISPROQUIM®: 080-050-847
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811
SAMU: 106

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

*Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. *Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. *Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

*Tóxico para mamíferos, aves, peces y organismos acuáticos invertibrados. *Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. *No aplicar en presencia de polinizadores. *No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. *Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Aplicar siguiendo la dirección del viento para evitar la deriva. *Notificar a los apicultores cercanos días antes de la aplicación del producto, para el confinamiento de las abejas. *Peligroso para organismos y plantas acuáticas. *No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos, envases vacíos, o sobranes del producto. *Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. *Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. *No permitir animales en el área tratada. *No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escurrimiento del producto por el suelo. *En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

STEWARD® 150 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Indoxacarb 150 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 904-SENASA

Titular del Registro:**FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL**

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N.° 208, Interior 705-B, Torre III,
Urbanización Club Golf los Incas, Santiago de Surco, Lima, Perú

Formulador por:

HELENA INDUSTRIES, LLC
434 Fenn Road Cordale, GA 31015 - USA

Importado y distribuido por:

FARMEX
Calle Dean Valdivia 148 Piso 5
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

Fecha de Formulación:**No. de Lote:****Contenido neto: 1 litro****Fecha de vencimiento:**

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada de FMC

22045288-2300

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO****INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

Steward® 150 EC es un insecticida formulado en forma de Concentrado Emulsionable (EC) para ser mezclado con agua y aplicado en aspersión foliar para el control del Gusano cogollero en maíz y Perforador del fruto en algodón y pimiento. Su principal ruta de control insecticida es por ingestión. También es absorbido a través de la cutícula del insecto. Su actividad biológica la ejerce inhibiendo el flujo del ion-sodio en las células nerviosas del insecto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**CUADRO DE USO:**

| CULTIVO | ENFERMEDAD | Dosis (ml/ha) | FRECUENCIA DE APLICACIÓN | P.C. (Días) | LMR |
|-----------|--|---------------|---|-------------|------|
| Maíz | Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>) | 200-300 | Realice como máximo una aplicación por campaña, considerando dos campañas al año. | 7 | 0.05 |
| Algodón | Gusano perforador (<i>Chloridea virescens</i>) | 300 | Realice como máximo dos aplicaciones por campaña, considerando una campaña por año. | 14 | 0.05 |
| Pimiento | Gusano perforador (<i>Chloridea virescens</i>) | 300 | Realice como máximo una aplicación por campaña, considerando dos campañas por año. | 7 | 0.3 |
| Arándanos | Gusano perforador (<i>Chloridea virescens</i>) | 0.3 | Para el control de <i>Heliothis virescens</i> , aplique Steward® 150 EC a la dosis recomendada, vía foliar, con la aparición de larvas en el follaje. Realizar una (01) aplicación campaña. | 7 | 1 |

P.C.: Período de Carencia.

LMR: Límite máximo de residuos.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingrese al área tratada antes de 24 horas.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Maíz: Aplique sobre larvas en los primeros estadios de desarrollo con los primeros síntomas de daño, o un nivel de infestación máximo del 5% de larvas en los cogollos. Algodón: Aplique sobre larvas en los primeros estadios de desarrollo con los primeros síntomas de daño o un nivel de infestación máximo del 5% de brotes con presencia de larvas. Primera aplicación durante el desarrollo vegetativo y la segunda iniciando el desarrollo de botones florales. Pimiento: Aplique sobre larvas en los primeros estadios de desarrollo con los primeros síntomas de daño o un nivel de infestación máximo del 5% de brotes con presencia de larvas.

Manejo de Resistencia: Para manejo de resistencia, Steward® 150 EC pertenece al grupo insecticida 22 subgrupo A (IRAC). El uso repetido y exclusivo de Steward® 150 EC o algún otro insecticida del grupo 22 puede llevar al desarrollo de poblaciones resistentes de insectos en algunos cultivos. Steward® 150 EC debe ser utilizado como parte de un Programa de Manejo Integrado de Plagas, el cual puede incluir prácticas culturales, el uso de variedades mejoradas genéticamente, el uso de medidas de control biológico, enfocado a prevenir daños económicos que pudiesen ser ocasionados por una plaga. La aplicación de este producto deberá hacerse en base a los principios y prácticas de un Control Integrado de Plagas, incluyendo métodos de detección como lo es el monitoreo de los campos, identificación apropiada de las plagas, monitoreos de la dinámica poblacional de la plaga y, la aplicación de productos en base a umbrales económicos de cada región.

COMPATIBILIDAD: Se recomienda hacer una pre-mezcla con una pequeña cantidad de producto deseado en el tanque y observar los posibles cambios adversos (precipitación, floculación, etc.).

FITOTOXICIDAD: Steward® 150 EC usado en las dosis recomendadas y siguiendo las indicaciones de esta etiqueta, no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad ni reducción en los rendimientos en los cultivos aquí recomendados.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Mochila manual de 20 litros de capacidad, empleando una boquilla tipo cono vacío.

Gasto de agua: 400-580 L/ha.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

PE_RT - Rev.02 - 30/05/23



| | |
|--|--------------------|
| Producto: Etiqueta - Steward 150 EC - 1L | CORES: |
| País: Brasil - Origen: Perú | ■ PRETO |
| Revisión: Rev.02 - 26/05/23 | ■ PANTONE YELLOW C |
| SKU label actual: 22045288-2300 | ■ PANTONE 199 C |
| SKU label novo: | ■ PANTONE 349 C |
| JOB: 182/23 | Logo FARMEX - CMYK |
| Formato: 270 mm x 150 mm | |
| Alterações: Inclusión de Arándanos. Cópia do RT Rev01 (Job 173_23) (Form_HELENA) - 23-05-23 (9/05/23 - Lorena Cortes) | |

Pictogramas: 8 mm x 8 mm