

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: -Este producto es tóxico si se ingiere. -Este producto causa irritación ocular moderada. -Dañino si se absorbe a través de la piel. -Dañino si se inhala. Evite respirar el vapor, polvo o aspersión. -Evite el contacto de este producto con la piel, los ojos y la ropa. Lávese con agua y jabón después de manipular el producto. -No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. -Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. -No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases. -Manténgase alejado del fuego y las chispas. -Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. -Remueva la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. -Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación. -Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. -No almacenar en casa de habitación. -No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. -Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar var alimentos o agua para consumo.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
EsSalud 0801-10200 - CISPQUIM 0800-50847

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



- Tóxico para mamíferos, aves, peces y organismos acuáticos invertebrados. -Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. -No aplicar en presencia de polinizadores. -No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos alejados. Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Aplicar siguiendo la dirección del viento para evitar la deriva. -Notificar a los apicultores cercanos días antes de la aplicación del producto, para el confinamiento de las abejas. -Peligroso para organismos acuáticos y plantas acuáticas. -No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos, envases vacíos o sobrantes del producto. -Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. -Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. -No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo. -En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Composición:	
Indoxacarb.....	150 g/L
Aditivos.....	C.S.D. 1 L

Composición:	
Indoxacarb.....	150 g/L
Aditivos.....	C.S.D. 1 L

Titular del registro: DuPont Perú S.A.C.
Av. República de Panamá 3531, Of. 1203 - Lima 27
Lima-Perú



No. Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO: 1 Litro

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



® Marca Registrada de E.I. du Pont de Nemours and Company



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA: Disuelva completamente la cantidad a usar de **Steward® 350 EC** del producto en un balde y luego deposítela en el tanque de mezcla que contenga agua hasta 3/4 de la mitad de su capacidad; complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla de vez en cuando y cada vez que vaya a llenar el equipo de aplicación previamente calibrado. Mantenga limpio y en buenas condiciones el equipo utilizado para la aplicación, cuidando que no se produzcan escapes ni contaminación externa.

EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA: Disuelva completamente la cantidad a usar de **Steward® 350 EC** del producto en un balde y luego deposítela en el tanque de mezcla que contenga agua hasta 3/4 de la mitad de su capacidad; complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla de vez en cuando y cada vez que vaya a llenar el equipo de aplicación previamente calibrado. Mantenga limpio y en buenas condiciones el equipo utilizado para la aplicación, cuidando que no se produzcan escapes ni contaminación externa.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (ml/ha)	FRECUENCIA DE APLICACIÓN	P.C. (días)	LMF (ppm)
Maíz	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	200-300	Realice como máximo una aplicación por campaña, considerando dos campañas al año.	7	0.05
Algodón	Perforador del fruto (<i>Heliothis virescens</i>)	300	Realice como máximo dos aplicaciones por campaña, considerando una campaña por año.	14	0.05
Pimiento	Perforador del fruto (<i>Heliothis virescens</i>)	300	Realice como máximo una aplicación por campaña, considerando dos campañas por año.	7	0.3

PERÍODO DE REINGRESO: Ingreso al área tratada: 24 horas después de la aplicación

EPOCA DE APLICACIÓN: **Maíz:** Aplique sobre larvas en los primeros estadios de desarrollo con los primeros síntomas de daño o un nivel de infestación máximo del 5% de larvas en los cogollos. **Ajodón:** Aplique sobre larvas en los primeros estadios de desarrollo con los primeros síntomas de daño o un nivel de infestación máximo del 5% de brotes con presencia de larvas. Primera aplicación durante el desarrollo vegetativo y la segunda iniciando el desarrollo de botones florales. **Pimiento:** Aplique sobre larvas en los primeros estadios de desarrollo con los primeros síntomas de daño o un nivel de infestación máximo del 5% de brotes con presencia de larvas.

Manejo de Resistencia: Para manejo de resistencia, **Steward® 150 EC** pertenece al grupo insecticida 22 sub-grupo A (IRAC). El uso repetido y exclusivo de **Steward® 150 EC** o algún otro insecticida del grupo 22 puede llevar al desarrollo de poblaciones resistentes de insectos en algunos cultivos. **Steward® 150 EC** debe ser utilizado como parte de un Programa de Manejo Integrado de Plagas, el cual puede incluir prácticas culturales, el uso de variedades mejoradas genéticamente, el uso de medidas de control biológico, enfocadas a prevenir daños económicos que pudiesen ser ocasionados por una plaga. La aplicación de este producto deberá hacerse en base a los principios y prácticas de un Control Integrado de Plagas, incluyendo métodos de detección como lo es el monitoreo de los campos, identificación apropiada de las plagas, monitoreos de la dinámica poblacional de la plaga v. la aplicación de productos en base a umbrales económicos de cada región.

COMPATIBILIDAD: Se recomienda hacer una pre-mezcla con una pequeña cantidad de producto deseado en el tanque y observar los posibles cambios adversos (precipitación, floculación, etc.).

FITOTOXICIDAD: Steward® 150 EC usado en las dosis recomendadas y siguiendo las indicaciones de esta etiqueta, no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad ni reducción en los rendimientos en los cultivos aquí recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas."



Ficha Técnica para etiqueta DuPont, información clasificada.

Etiqueta Couche Adhesivo, impresión en Off-Set, para presentación de botella de 1Lt.

Alto: 150 mm	Largo: 270 mm	Tolerancia: 1mm +/-
------------------------	-------------------------	-------------------------------

Línea de corte _____
 Línea de área de texto - - - - -
 Radio de esquinas de etiqueta Ø 1/8

19-sep-2016

Colores:

Colores: PMS 186, 349, 293, 3275 Black 100% Yellow 100%

Razón de Cambio:

Código A Obsoleto:
N/A

Ampliación de cultivos