

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Talstar®

100 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:

Bifenthrin..... 100 g/L

Aditivos.....c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 689 -SENASA




NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



Nombre químico: IUPAC:
(2-methyl(1,1'-biphenyl)-3-yl)methyl (1R,3R)-rel-3-
(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate

Fórmula estructural:



Fórmula empírica: C23 H22 Cl F3 O2

Peso molecular: 422.88 g/mol

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto: Líquido de color ligeramente café

Capacidad y clase de envases: 250 ml, 500 ml y
1 litro PEAD

Titular del Registro:

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL

Av. Circunvalación del Club Golf Los
Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III.
Urbanización Club Golf Los Incas.
Santiago de Surco. Lima, PERÚ.



Formulado por:

FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

Av. José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150
1º Andar, Galleria Plaza - Campinas - CEP
13091 - Campinas, Brasil
Telf: +55-19-2042-4500

Distribuido por:

AGRO KLINGE S.A.

Av. El Derby 254 Int. 306 Urb.
El Derby de Monterrico. Lima - Lima,
Santiago de Surco



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y
APLICACIÓN:

- Peligro si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- Este producto es nocivo por ingestión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación (guantes largos resistentes a químicos, máscara de respiración con filtro de cartucho para vapores orgánicos con un prefiltro para material particulado, botas altas hasta la pantorrilla, resistente a químicos, cubretodo sintético sobre la ropa de trabajo de algodón, capucha impermeable, y gafas de seguridad o lentes de protección, visor, contra salpicadura lateral) para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

- Guardar en un lugar fresco y seco y con buena ventilación, lejos de la casa de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No reutilizar el envase vacío.
- Mantener el producto alejado del fuego.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Piretroide.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta. No deje sólo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte.
- Antídoto: No tiene antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE
INTOXICACIÓN:

SAMU: 106

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811
CISPROQUIM®: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE
DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

"Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin".

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



"REALIZAR OBLIGATORIAMENTE EL TRIPLE
LAVADO DEL PRESENTE
ENVASE.DEVUELVA EL ENVASE TRIPLE
LAVADO AL CENTRO DE ACOPIO
AUTORIZADO"

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligro para abejas u otros artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de hasta 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe respetar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

LIMPIEZA DEL EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DEL
PESTICIDA:

- Antes de la aplicación, comience con un equipo limpio y en buenas condiciones de mantenimiento.
- Inmediatamente después de la aplicación, limpie completa y cuidadosamente todo el equipo utilizado para la aspersión con el fin de reducir el riesgo de formación de depósitos endurecidos que pueden ser difíciles de remover.
- Escurra el agua que haya quedado en equipo de la aplicación.
- Enjuague bien nuevamente todo el equipo (el rociador, la barra de pulverización, las mangueras y boquillas) con agua limpia y escurra nuevamente.
- Limpie todos los demás implementos asociados con el equipo de la aplicación.
- Tome todas las precauciones de seguridad necesarias cuando realice la limpieza del equipo.
- No realice la limpieza cerca de pozos, fuentes de agua o vegetación deseable.
- Elimine los desperdicios de las aguas de lavado de acuerdo con las reglamentaciones locales.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Talstar® 100 EC es un insecticida piretroide sintético con un amplio espectro de actividad en el control de una amplia gama de insectos masticadores chupadores.

Talstar® 100 EC actúa por medio de contacto e ingestión. Talstar® 100 EC no es sistémico, una cobertura completa es esencial.

Talstar® 100 EC pertenece a la clasificación internacional de modo de acción de insecticidas, IRAC N° 3

Resistencia: Talstar® 100 EC puede usarse como parte de las estrategias de manejo de resistencia establecidas para el cultivo. Para reducir o evitar esta aparición de resistencia, debe recurrirse al uso de productos de diferente grupo químico y de modo de acción diferente.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Vierta la cantidad de Talstar® 100 EC en el tanque de mezcla que contenga agua hasta ¾ ó la mitad.

En caso de realizar mezclas con otros productos, primero agregar productos empacados en bolsa soluble en agua, luego agregar productos formulados como gránulos dispersables y polvo mojable, luego agregar Talstar® 100 EC y otros concentrados según recomendación de la etiqueta.

Por último, añadir productos a base de aceite y adyuvantes antes de llenar el tanque con agua limpia.

Agitar el tanque a fondo para asegurar una mezcla completa.

Complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea.

Agite la mezcla cada vez que vaya a llenar el equipo.

No guarde la mezcla en el tanque de la aspersora de un día para otro.

“CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		Dosis L/Ha	Dosis (L/cil)	PC* (días)	LMR** (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO				
Papa	"Gorgojo de los Andes"	<i>Premnotypus suturalis</i>	1.10 - 1.20	-	21	0.05
Pimiento	"Polilla zancudo"	<i>Lineodes Integra</i>	0.63	-	7	0.2
Arroz	"Sogata"	<i>Tagosodes orizicolus</i>	0.3	0.3	40	0.01
Palto	"Acaro marrón"	<i>Oligonychus punicae</i>	0.5	-	21	0.01
Mandarino	"Araña roja"	<i>Panonychus citri</i>	0.5	0.1	21	0.05
Vid	"Araña roja"	<i>Tetranychus urticae</i>	0.5	-	14	0.3

*PC.: Período de Carenia

**L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar al inicio de la infestación, no mayor del 5 %.

No realizar más de 3 aplicaciones por campaña.

En el cultivo de Papa, efectuar las aplicaciones entre el brotamiento y el aporque, dirigidas principalmente al cuello de las plantas.

Arroz, una aplicación cuando comiencen aparecer las primeras infestaciones con temperaturas bajo los 30°, aplicar sin presencia de abejas. Una aplicación por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO:

Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con los fungicidas e insecticidas más utilizados, sin embargo se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla. No mezclar con cianamida hidrogenada o azufre.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



120 mm

120 mm