ANEXO 6. PROYECTO DE ETIQUETA – NOMADE – PRESENTACIÓN DE 1 kg & 25 kg

NOMADE

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES – WG

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Metribuzin.....700 g/kg
Aditivos……..c.s.p .....1 kg

Titular del Registro:
FARMEX S.A.
Fabricado y formulado por:
SULPHUR MILLS LIMITED.
604/605, 349-Business Point, Western Express Highway, Andheri (E),
Mumbai-400 069, INDIA.

Importado y Distribuido por:
FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7, San Isidro, Lima, Perú.

Reg. N°

Contenido Neto:
1 kg & 25 kg

Lote Nº:
F. Fab.:
F. Venc.:

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas y forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Peligroso si es inhalado. Evite aspirar el polvo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: 1,2,4-triazinona.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua durante 15 minutos
- En caso de contacto con la piel, remueva la ropa contaminada. Lave con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire al paciente al aire fresco. Si es necesario dé respiración artificial.
- En caso de ingestión, administre grandes cantidades e agua. Induzca el vómito introduciendo un dedo en la garganta hasta que el vómito salga claro. No induzca al vómito si el paciente está inconsciente. Llame al médico.
- Teléfonos de emergencia: Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud: 117 (línea gratuita), CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita) ó (01)328-7398, Farmex S.A.: (01) 630-6400.

NOTA AL MÉDICO

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y depósitelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Los envases no deben utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos, restos de aplicación y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

LEA DETENIDAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

NOMADE es un herbicida sistémico, selectivo, preemergente y postemergente temprano para el control de malezas anuales gramíneas y de hoja ancha en los cultivos indicados en el cuadro de usos. NOMADE actúa inhibiendo la fotosíntesis. Es absorbido principalmente por las raíces, pero también por las hojas, y es traslocado por el xilema.

Añadir los gránulos en un pequeño volumen de agua. Forme una pasta cremosa removiendo constantemente. Vacíe esta pasta al volumen de agua necesario para la dilución recomendada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS:

Cultivo	Malezas			Dosis		PC	LMR
		Nombre comùn	Nombre cientifico	g/cil	g/ha		
Espárrago	Malezas gramíneas	Pata de gallina Coquito Rabo de zorro Grama china Cadillo Moco de pavo	*Eleusine indica* *Cyperus rotundus* *Setaria geniculata* *Sorghum halepense* *Cenchrus echinatus* *Echinochloa crus-galli/ Echinochloa cruspavonis*	100	150	21	0.1
Papa				150	--	60	0.1
Capsicum annuum	Malezas de hoja ancha	Yuyo hembra Yuyo macho Verdolaga Amor seco Campanilla Lechera Chamico Cerraja Hierba gallinazo Capuli	*Amaranthus hybridus* *Amaranthus caudatus* *Portulaca oleracea* *Bidens pilosa* *Ipomoea purpurea* *Euphorbia heterophylla* *Datura stramonium* *Sonchus oleraceus* *Chenopodium murale* *Nicandra physaloides*	150	--	60	0.1

PC: período de carencia. LMR: límite máximo de residuos.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto en mezclas altamente concentradas.

FITOTOXICIDAD

NOMADE no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

FARMEX S.A garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO