

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es tóxico por inhalación y sensibilizante cutáneo. Evite respirar el polvo y la aspersión; evite el contacto con la piel y la ropa.
- Almacenar en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. No manipule el producto en ambientes cerrados, sólo en campo abierto.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Organofosorado
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta
  - En caso de ingestión, no provocar el vómito, ni dar agua a la persona si está inconsciente. Llévelo al médico
  - En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 min. Consultar al médico.
  - En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario. Consultar al médico.

Antídotos: Emplear sulfato de atropina, de 1 a 2 mg cada 15 minutos (intravenosa o intramuscular) hasta síntomas de atropinización o hasta un máx. de 30 mg; también puede administrarse 2 +PAM o toxigonin (Merck), en dosis de 1 a 2 g por vía intravenosa lentamente. Para menores de 12 años la dosis inicial es de 0.05 mg/kg de peso, reemplazando de 0.02-0.05 mg/kg de peso. Contraindicaciones: morfina, fenotiazinas y teofilina.

**Teléfono de emergencia**  
 CICOTOX: 0800-1-3040 ESSALUD: 0801-10200 FMC: 1-4214811

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**  
**ENVASES VACÍOS:**

- o Después de usar el contenido del envase enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- o Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- o Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.



# Rugby® 200 CS

## NEMATICIDA AGRÍCOLA

### CÁPSULAS EN SUSPENSIÓN (CS)

**Composición Química**

Cadusafos..... 200 g/l  
 Aditivos..... 1 l  
 c.s.p

Reg. PQUA N° 911 - SENASA

Titular del Registro: FMC Latinoamérica S.A. Sucursal

**Formulado por:**

**FMC Corporation**  
 Agricultural Products Group  
 1735 Market Street  
 Philadelphia, PA 19103, USA  
 www.fmc.com

**Importado y Distribuido por:**

**Fitocorp S.A.C.**  
 Calle Los Tejedores 187, Urb. Vulcano,  
 Ate- Lima, Perú



**Fecha de Formulación:**

**Fecha de Vencimiento:**

**N° de Lote:**

**CONTENIDO NETO: 1 L**

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**

\*Marca registrada de FMC Corporation



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Rugby® 200 CS** es un nematocida no sistémico que actúa por contacto e ingestión. Perteneció al grupo de los fosforados, y como tal inhibe la enzima colinesterasa, sobreexcitando el sistema nervioso del nematodo y finalmente causándole la muerte.

**Rugby® 200 CS** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua, mezclar y luego, completar con agua hasta el volumen requerido. Aplicar con inyector o Venturi al sistema de riego, en caso no disponer sistema de riego, usar equipo de aplicación dirigido al cuello de planta (drench).

**Rugby® 200 CS, SOLO DEBE APLICARSE AL SUELO, NUNCA AL FOLLAJE.** El suelo debe estar en capacidad de campo. NUNCA APLIQUE EN SUELOS SECOS.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**CUADRO DE USOS**

Cultivo	Plaga		Dosis l/ha	P.C.* (días)	LMR ** (ppm)
	Nombre Común	Nombre científico			
Vid	Nematodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	10-15	70	0.01

\* PC = Período de Carenia

\*\* LMR = Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

- Máximo 1 aplicación por Campaña. Considerando 1 campaña al año. Dosis máxima 15 l/ha
- Aplicar a la presencia de la plaga, teniendo mayor cuidado en la etapa de desarrollo radicular
- De persistir la plaga, usar otro nematocida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.
- No aplicar en floración.

**PERIODO DE REINGRESO:**

- Puede reingresar al área tratada, 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Rugby® 200 CS puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas, excepto los de reacción alcalina, sin embargo se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

**FITOTOXICIDAD:**

El producto no es fitotóxico al cultivo a la dosis dada, y según las indicaciones dadas

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

“El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

