

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es tóxico por inhalación y sensibilizante cutáneo. Evite respirar el polvo y la aspersión; evite el contacto con la piel y la ropa.
- Almacenar en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. No manipule el producto en ambientes cerrados, sólo en campo abierto.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo químico: Organofosforado.

- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito, ni dar agua a la persona si está inconsciente. Lévelo al médico.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 min. Consultar al médico.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario. Consultar al médico.

Antídotos: Emplear sulfato de atropina, de 1 a 2 mg cada 15 minutos (intravenosa o intramuscular) hasta síntomas de atropinización o hasta un máx. de 30 mg; también puede administrar 2 -PAM o toxigónin (Merck), en dosis de 1 a 2 g por vía intravenosa lentamente. Para menores de 12 años la dosis inicial es de 0.05 mg/Kg de peso, repitiendo de 0.02-0.05 mg/kg de peso. Contraindicaciones: morfina, fenotiazinas y teofilina.

**Teléfono de emergencia**

CICOTOX: 0800-1-3040 ESSALUD: 0801-10200 FMC: 1-4214811

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido del envase enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

# Rugby® 200 CS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**NEMATICIDA AGRÍCOLA**

CAPSULAS EN SUSPENSIÓN (CS)

**Composición**

Cadusafos ..... 200 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p 1 L

Reg. PQA N° 911 - SENASA

**Titular del Registro:**

**FMC Latinoamérica S.A. Sucursal**

Av. República de Panamá 3531  
 Int. 1203, San Isidro - Lima, Perú.

**Formulado por:**

**FMC Corporation**

Agricultural Products Group

1735 Market Street

Philadelphia, PA 19103, USA

www.fmc.com



**Importado y Distribuido por:**

**FARMAGRO S.A.**

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos, Lima - PERÚ

Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

**FARMAGRO**   
 MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

**Fecha de Formulación:**

**Fecha de Vencimiento:**

**N° de Lote:**

**CONTENIDO NETO: 200 L**

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**

®Marca registrada de FMC Corporation.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Rugby® 200 CS** es un nematocida no sistémico que actúa por contacto e ingestión. Perteneciente al grupo de los fosforados, y como tal inhibe la enzima colinesterasa, sobreexcitando el sistema nervioso del nematodo y finalmente causándole la muerte.

**Rugby® 200 CS** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua, mezclar y luego, completar con agua hasta el volumen requerido. Aplicar con inyector o Venturi al sistema de riego, en caso no disponer sistema de riego, usar equipo de aplicación dirigido al cuello de planta (drench).

**Rugby® 200 CS**, SOLO DEBE APLICARSE AL SUELO, NUNCA AL FOLLAJE. El suelo debe estar en capacidad de campo. NUNCA APLIQUE EN SUELOS SECOS.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**CUADRO DE USOS**

Cultivo	Plaga		Dosis L/ha	P.C.* (días)	LMR ** (ppm)
	Nombre Común	Nombre científico			
Vid	Nematodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	10-15	70	0.01

\*\*PC = Período de Carenia

\*\*LMR = Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

- Máximo 1 aplicación por Campaña. Considerando 1 campaña al año. Dosis máxima 15 L/ha.
- Aplicar a la presencia de la plaga, teniendo mayor cuidado en la etapa de desarrollo radicular.
- De persistir la plaga, usar otro nematocida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.
- No aplicar en floración.

**PERIODO DE REINGRESO:**

- Puede reingresar al área tratada, 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

**Rugby® 200 CS** puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas, excepto los de reacción alcalina, sin embargo se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.


**FITOTOXICIDAD:**

El producto no es fitotóxico al cultivo a la dosis dada, y según las indicaciones dadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

“El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

PE\_RT - Rev.00 - 26/01/17



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**



	Cliente: FMC	<b>CORES:</b>
	Producto: RT - Rugby 200 CS - 200 L	■ PRETO
	País: Perú	■ PANTONE YELLOW C
	Revisão: PE_RT - Rev.00 - 26/01/17	■ PANTONE 199 C
	JOB: 096/17	■ PANTONE 347 C
Formato: 11" x 8" ½	FARMAGRO+ Logo em CMYK	