

Tamaño de letra: 7 puntos

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
 “MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico por inhalación y sensibilizante cutáneo. Evite respirar el polvo o el aerosol de la aspersión. Evite el contacto directo de este producto con la piel y la ropa.
- Almacenar en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicamentos, bebidas o forrajes.
- Utilice todo el equipo de protección personal requerido durante la mezcla, manipulación y aplicación del producto, y para ingresar a las áreas tratadas dentro de las primeras 24 horas después de la aplicación del producto. No manipule el producto en ambientes cerrados, solo en campo abierto.
- No comer, beber ni fumar durante la utilización de este producto o durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Aplicar siguiendo la dirección del viento.
- Después de la aplicación de este producto, cámbiese y lave su ropa contaminada, y lave con abundante agua y jabón las partes del cuerpo que puedan haber estado en contacto con el producto.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Organofosfato.

- En caso de intoxicación, lleve al paciente al centro de salud más cercano y muéstrele al médico esta etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito, ni dar agua ni nada por la boca a una persona inconsciente. Lleve al paciente al centro de salud más cercano.
- En caso de contacto con los ojos, mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos inmediatamente con agua limpia durante 15 min. Busque atención médica.
- En caso de contacto con la piel, quítese la ropa y zapatos. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, traslade al paciente a un lugar fresco y bien ventilado. Proporcione respiración artificial si es necesario. Busque atención médica.

Antídotos: Emplear sulfato de atropina, de 1 a 2 mg cada 15 minutos (intravenosa o intramuscular) hasta síntomas de atropinización o hasta un máx. de 30 mg; también puede administrar 2-PAM o toxigónin (Merck), en dosis de 1 a 2 g por vía intravenosa lentamente. Para menores de 12 años la dosis inicial es de 0.05 mg/kg de peso, repitiendo de 0.02-0.05 mg/kg de peso. Contraindicaciones: morfina, fenotiazinas y teofilina.

Teléfonos de emergencia:

CISPROQUIM®: 080-050-847

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811

SAMU: 106

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido del producto, enjuague el envase tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Después de realizar el triple lavado, inutilizar el recipiente triturándolo o perforando su base. Deseche el recipiente en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Es obligatorio el triple lavado de este envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Este producto es peligroso para las abejas u artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Avisar a los apicultores antes de aplicar el producto, para que puedan confinar a sus abejas de manera oportuna.
- Aplicar el producto a primera hora de la mañana o por la tarde.
- Peligroso para peces y otros organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los sobrantes de la aplicación o envases vacíos.
- Establecer una banda de protección de al menos 10 metros de las fuentes de agua.
- No aplique este producto en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en las áreas tratadas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva del producto.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

Tamaño de letra: 7 puntos

Rugby® 200 CS

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA**CAPSULAS EN SUSPENSION (CS)****Composición**

Cadusafos200 g/L
 Aditivos..... c.p.s. 1 L

Reg. PQUA N° 911 - SENASA**Titular del Registro:****FMC Latinoamérica S.A. Sucursal**

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas n° 208,
 Interior 705-B, Torre III. Urbanización Club Golf los
 Incas. Santiago de Surco. Lima, PERÚ.

Formulado por:**FMC Corporation.**

2929 Walnut St. Filadelfia,
 PA 19104 - Estados Unidos

Importado y Distribuido por:**FARMEX S.A.**

Calle Dean Valdivia 148 Piso 7

San Isidro, Lima 27 - PERÚ

Teléfono: (01) 630-6400

www.farmex.com.pe

**Fecha de formulación:****Número de lote:****Fecha de vencimiento:****CONTENIDO NETO: 200 L****NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**

FMC y Rugby son marcas comerciales de FMC Corporation y / o una
 filial. © 2021 FMC Corporation. Reservados todos los derechos.

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

Tamaño de letra: 7 puntos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Rugby® 200 CS es un nematocida no sistémico que actúa por contacto e ingestión. El nematocida Rugby® 200 CS es un organofosforado y como tal inhibe la enzima colinesterasa, sobreexcitando el sistema nervioso del nematodo y finalmente provocando su muerte.

El nematocida Rugby® 200 CS se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua. Mezclar y completar con agua hasta el volumen requerido. Aplicar con un inyector o Venturi al sistema de riego, asegurándose de que la cinta de riego y los emisores de goteo estén cerca de la planta. Si no hay un sistema de riego disponible, use equipo de aplicación dirigido al cuello de planta, empapandola (drench).

El nematocida Rugby® 200 CS, DEBE APLICARSE ÚNICAMENTE AL SUELO. NUNCA AL FOLLAJE. El suelo debe estar en capacidad de campo. NUNCA APLIQUE EN SUELOS SECOS O SATURADOS.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”.

Cultivo	Nombre de la Plaga		Dosis L/ ha	P.C. (días)	LMR ppm
	Común	Científico			
Vid	Nematodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	10-15	70	0.01
Pimiento	Nematodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	15	NA.	0.01
Papa	Nematodo quiste de la papa	<i>Globodera pallida</i>	15	102	0.01

P.C.: Período de carencia en días

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en ppm (partes por millón)

No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

- Realizar un máximo de una (1) aplicación por campaña, considerando 1 campaña al año. Dosis máxima 15 L/ ha.
- Aplicar cuando se detecte la presencia de la plaga, siendo más cuidadoso en la etapa de desarrollo radicular.
- Si persiste la presencia de la plaga, utilice otro nematocida con un modo de acción diferente para evitar la resistencia del producto.
- No aplicar durante la floración

En vid: Realizar una aplicación, al inicio de la brotación o después de la cosecha.

En pimiento: Aplicar el producto entre 5 - 7 días después del trasplante

En papa: Realice la aplicación al momento de la siembra. Pulverizar en el fondo del surco intentando cubrir la semilla. Forme una banda de 15 a 20 centímetros antes de cubrir la semilla. El campo a tratar debe manejarse bajo el esquema de rotación de cultivos. Se debe realizar una buena preparación del suelo. Se debe realizar un deshierbe manual. Se deben realizar muestreos y observaciones de campo para el monitoreo de plagas. La humedad del suelo debe estar a capacidad de campo. Después de la aplicación del producto, el siguiente riego debe retrasarse el mayor tiempo posible, dentro de las prácticas agronómicas permitidas.

PERIODO DE REINGRESO:

- Se permite el reingreso al área tratada 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD:

El nematocida Rugby® 200 CS se puede aplicar en mezclas con la mayoría de los plaguicidas, excepto aquellos con reacción alcalina; sin embargo, se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos a aplicar.

FITOTOXICIDAD:

Este producto no es fitotóxico para el cultivo cuando se aplica a las dosis recomendadas y según las indicaciones dadas.

Cadusafos, de acuerdo a la clasificación FRAC pertenece al Grupo N-1B, nematocida.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.”

215 mm



Producto: RT - Rugby 200 CS - 200 L - PE	CORES:
País: Perú - Distribuidor: Farmex	■ PRETO
Revisión: Rev.03 - 10/02/22	■ PANTONE YELLOW C
SKU label actual: n/a	■ PANTONE 199 C
SKU label novo: n/a	■ PANTONE 347 C
JOB: 423/21	■ PANTONE 287 C
Formato RT: 280 mm x 215 mm	■ PANTONE 362 C
Alterações: NOVO TEXTO - ATUALIZACION STEWARDSHIP - PERU(Ana - 17/11/21)	

Pictogramas: 7 mm x 7 mm