



**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reemplazar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, aceites, jabones, etc.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo toxicológico: Avenamiento.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, láveselos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, cámbiese la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colócase a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTEX: 328-7799
ESSALUD: 411-8000 (línea 4)
CIBPROQUIM: 980-58847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Devolva o utilice el contenido, entregue el envase y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.

MEASAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Perigoso para las abejas y otros artrópodos beneficiosos. No aplicar en época de floración.
- No tóxico para la fauna acuática.
- No tóxico para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.

PERIODO DE RENDIMIENTO

Puede regresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso de lluvia, regrese al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

COLOSO 50 SG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

COLOSO 50 SG no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto, contempladas en este etiquetado, corresponden a las indicadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)		
NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200L	g/ha			
ALCACHOFA	Gusano perforador	-	150 - 200	30	0.1	
ARANDANO	Gusano perforador	-	100	-	14	0.01
ESPARRAGO	Gusano cogollero	-	150	3	0.05	
MAÍZ	Gusano cogollero	-	100 - 150	7	0.01	
PALTO	Gusano del cesto	-	70	-	14	0.005
PIMIENTO	Gusano perforador	-	200	3	0.02	
VINO	Eumargarita	-	80 - 100	25	0.01	

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuo

L. SILVESTRE



PANTONE 377 C
C 50 - M 1 - Y 100 - K 20

L. SILVESTRE



PANTONE 343 C
C 89 - M 19 - Y 72 - K 60

L. COLOSO



PANTONE 295 C

B. TOXICOLÓGICA



PANTONE 293 C

TEXTO



P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de GRUPO SILVESTRE