



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Gránulos solubles - SG**

**Composición:**

Emamectin benzoato : 50 g/kg

Aditivos : c.s.p.1kg

Registro PQUA N° 915 - SENASA



Titular de Registro :

**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.  
Tel.: (01) 617-3300  
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Importado y Distribuido por:

**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

**Contenido Neto: 250 g**

Formulado por:

**NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.**

8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.  
Nanjing 211100 CHINA.

N° Lote  
F. de Form.  
F. de Venc.

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Avermectina
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

**CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398**

**ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4)**

**CISPROQUIM: 0800-50847**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o en cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO   | PLAGA               |                              | DOSIS  |           | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|---------------------|------------------------------|--------|-----------|--------------|--------------|
|           | NOMBRE COMÚN        | NOMBRE CIENTÍFICO            | g/200L | g/ha      |              |              |
| ESPÁRRAGO | "Gusano cogollero"  | <i>Spodoptera frugiperda</i> | -      | 150       | 3            | 0.05         |
| PALTO     | "Gusano del cesto"  | <i>Oiketicus kirbyi</i>      | 70     | -         | 14           | 0.01         |
| PIMIENTO  | "Gusano perforador" | <i>Heliothis virescens</i>   | -      | 200       | 3            | 0.02         |
| ALCACHOFA | "Gusano perforador" | <i>Heliothis virescens</i>   | -      | 150 - 200 | 30           | 0.1          |

PC: Período de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- Aplicar siguiendo la dirección del viento para evitar la deriva.
- Peligroso para organismos acuáticos y plantas acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositar en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**COLOSO® 50 SG** es un insecticida de contacto e ingestión usado para el control de lepidópteros como *Heliothis virescens*.

**COLOSO® 50 SG** se prepara diluyendo la dosis en la mitad de la capacidad del tanque con agua, agitar bien y completar con agua al volumen deseado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña, cuando se observe los primeros síntomas de la plaga en el cultivo. Para el cultivo de alcachofa se recomienda realizar 1 aplicación por campaña, con 2 campañas al año, en la etapa de fructificación.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD**

**COLOSO® 50 SG** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

**COLOSO® 50 SG** no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

