20.0 cm

8.00 cm

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Causa irritación moderada a los ojos.
- En contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo Químico : Estrobilurina + Triazol
- En caso de intoxicación llame al médico, comunicarse con un centro de emergencias toxicológicas o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión: No provocar vómito, no dar nada por la boca a una persona inconsciente, obtener asistencia médica inmediatamente, comunicarse con un centro de emergencias o trasladar al paciente a un centro médico.

Nota al médico: No tiene antídoto específico , aplicar tratamiento sintómatico

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800-1-3040 (gratuito) ó **CROP BUSINESS SAC: 349-2669**

CIPROSQUIM: 328-7398 **Centro Nacional de Emergencia Essalud: 117**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacios
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en

LUXOR TOP®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:
Azoxystrobin ..... 200 g/L
Difenoconazole ..... 125 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 913 - SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.
Importado y distribuido por:
CROP BUSINESS S.A.C.

Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:
Nº de Lote:
Contenido Neto: 250 ml
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road
Songjiang Distric, Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
LUXOR TOP es un fungicida sistémico y traslaminar de amplio espectro utilizado para el control del ¨Tizón temprano¨, ¨Mancha del peral¨ y ¨Pyricularia¨ en los cultivos de papa, cebolla y arroz respectivamente.
LUXOR TOP se prepara haciendo una pre-mezcla de la dosis en la mitad del volumen de agua, agitar bien y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/Ha		
Papa	Tizón temprano	*Alternaria solani*	0.2	0.4	7	0.1
Cebolla	Mancha del peral	*Stemphylium vesicarium*	0.1	0.3	3	0.01
Arroz	Pyricularia	*Pyricularia oryzae*	-	0.5	30	5.0[1] 0.05[2]
Vid	Oidium	*Erysiphe necator*	-	0.5	21	2.0[1] 3.0[2]
Espárrago	Roya	*Puccinia asparagi*	0.2	0.5	100	0.01[1] 0.05[2]
Arándano	Cabeza de clavo	*Alternaria tenuissima*	-	0.5	1	5.0[1] 0.1[2]
Pimiento	Oidiosis	*Leveillula taurica*	0.15	-	3	3.0[1] 0.8[2]

P.C.: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Límites máximos de residuos (PPM: Partes por millón)
[1]Azoxystrobin ; [2]Difenoconazole

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:
Para los cultivos de papa y cebolla realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo. Para el cultivo de arroz realizar hasta 1 aplicación por campaña.
Aplicar cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la misma.
PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no ingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

1.2 cm