

20.0 cm

8.00 cm

**LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Causa irritación moderada a los ojos.
- En contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo Químico: Estrobilurina + Triazol  
- En caso de intoxicación llame al médico, comunicarse con un centro de emergencias toxicológicas o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

- En caso de ingestión: No provocar vómito, no dar nada por la boca a una persona inconsciente, obtener asistencia médica inmediatamente, comunicarse con un centro de emergencias o trasladar al paciente a un centro médico.

Nota al médico: No tiene antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0800-1-3040 (gratuito) ó CROP BUSINESS SAC: 349-2669

CIPROSQUIM: 328-7398 Centro Nacional de Emergencia Essalud: 117

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en



# LUXOR TOP®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**Composición:**

Azoxystrobin ..... 200 g/L  
Difenoconazole ..... 125 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 913 - SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y distribuido por:



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina  
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 250 ml

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

NORCHEM JIANGSU CORPORATION

West Tower, Fortune International Building

N° 359 Hongwu Road, Nanjing

CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

LUXOR TOP es un fungicida sistémico y traslaminar de amplio espectro utilizado para el control del "Tizón temprano", "Mancha del peral" y "Pyricularia" en los cultivos de papa, cebolla y arroz respectivamente.

LUXOR TOP se prepara haciendo una pre-mezcla de la dosis en la mitad del volumen de agua, agitar bien y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO   | PLAGAS           |                               | DOSIS   |      | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm)                        |
|-----------|------------------|-------------------------------|---------|------|----------------|----------------------------------------|
|           | Nombre Común     | Nombre Técnico                | L/200 L | L/Ha |                |                                        |
| Papa      | Tizón temprano   | <i>Alternaria solani</i>      | 0.2     | 0.4  | 7              | 0.1                                    |
| Cebolla   | Mancha del peral | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 0.1     | 0.3  | 3              | 0.01                                   |
| Arroz     | Pyricularia      | <i>Pyricularia oryzae</i>     | -       | 0.5  | 30             | 5.0 <sup>1</sup><br>0.05 <sup>2</sup>  |
| Vid       | Oidium           | <i>Erysiphe necator</i>       | -       | 0.5  | 21             | 2.0 <sup>1</sup><br>3.0 <sup>2</sup>   |
| Espárrago | Roya             | <i>Puccinia asparagi</i>      | 0.2     | 0.5  | 100            | 0.01 <sup>1</sup><br>0.05 <sup>2</sup> |
| Arándano  | Cabeza de clavo  | <i>Alternaria tenuissima</i>  | -       | 0.5  | 1              | 5.0 <sup>1</sup><br>0.1 <sup>2</sup>   |
| Pimiento  | Oidiois          | <i>Leveillula taurica</i>     | 0.15    | -    | 3              | 3.0 <sup>1</sup><br>0.8 <sup>2</sup>   |

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límites máximos de residuos (PPM: Partes por millón)  
<sup>1</sup>Azoxystrobin, <sup>2</sup>Difenoconazole

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:**

Para los cultivos de papa y cebolla realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo. Para el cultivo de arroz realizar hasta 1 aplicación por campaña.

Aplicar cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la misma.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se recomienda no ingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



12 cm