

20.0 cm

8.00 cm

**LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Causa irritación moderada a los ojos.
- En contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Estrobilurina + Triazol
- En caso de intoxicación llame al médico, comunicarse con un centro de emergencias toxicológicas o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión: No provocar vómito, no dar nada por la boca a una persona inconsciente, obtener asistencia médica inmediatamente, comunicarse con un centro de emergencias o trasladar al paciente a un centro médico.

Nota al médico: No tiene antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800-1-3040 (gratuito) ó CROP BUSINESS SAC: 349-2669

CIPROSQUIM: 328-7398 Centro Nacional de Emergencia Essalud: 117

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en



LUXOR TOP®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Azoxystrobin 200 g/L
Difenoconazole 125 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 913 - SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y distribuido por:



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 250 ml

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

NANJING RHONQUIM CO., LTD

N° 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009

CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

LUXOR TOP es un fungicida sistémico y traslaminar de amplio espectro utilizado para el control del "Tizón temprano", "Mancha del peral" y "Pyricularia" en los cultivos de papa, cebolla y arroz respectivamente.

LUXOR TOP se prepara haciendo una pre-mezcla de la dosis en la mitad del volumen de agua, agitar bien y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/Ha		
Papa	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.2	0.4	7	0.1
Cebolla	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.1	0.3	3	0.01
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0.5	30	5.0 ¹ 0.05 ²
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.5	21	2.0 ¹ 3.0 ²
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0.2	0.5	100	0.01 ¹ 0.05 ²
Arándano	Cabeza de clavo	<i>Alternaria tenuissima</i>	-	0.5	1	5.0 ¹ 0.1 ²
Pimiento	Oidiois	<i>Leveillula taurica</i>	0.15	-	3	3.0 ¹ 0.8 ²

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límites máximos de residuos (PPM: Partes por millón)
¹Azoxystrobin, ²Difenoconazole

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Para los cultivos de papa y cebolla realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo. Para el cultivo de arroz realizar hasta 1 aplicación por campaña.

Aplicar cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la misma.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no ingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



12 cm