

23 cm

TRECKER®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Triflumizole 500 g/Kg
Aditivos csp 1 Kg

Reg PQUA N° - SENASA

INTEROC @ CUSTER

**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.

Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Formulador:
**ZHEJIANG HEBEN
PESTICIDE & CHEMICALS CO., LTD**
Liandun Rd, Houjing,
Yanjiang Industrial Area,
Wenzhou, Zhejiang, P.R. China

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 500g
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

15 cm

15 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar alergia en ciertas personas.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Imidazole.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar agua a la persona si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 min.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lave la piel con abundante agua y jabón por 15 min.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CIPROSQUIM: 0800-5-0847. ESSALUD: 107 ó 0801-10200
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Altamente peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.

- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos **10 metros**.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TRECKER®, es un fungicida sistémico, con acción curativa y protectante, que actúa interfiriendo la biosíntesis del ergosterol y aumentando la permeabilidad en la membrana celular, lo que conlleva a la muerte del hongo.

TRECKER®, se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, (usar de preferencia agua con pH 5 a 6), agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente. El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña al año, con un intervalo de 7 días entre aplicaciones. Aplicar a la presencia de la enfermedad y la segunda aplicación previa evaluación y si las condiciones ambientales favorecen la presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis, y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/cil de 200L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid	“Oidiosis”	<i>Erysiphe necator</i>	30 - 60	7	0.05

PC: Periodo de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos



3.4 cm