

# TRECKER®

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### POLVO MOJABLE (WP)

#### COMPOSICIÓN:

Triflumizole ..... 500 g/Kg  
Aditivos ..... csp 1 Kg

### Reg PQUA N° 912 - SENASA

## INTEROC@CUSTER

**Titular de Registro,  
Importador y Distribuidor:**

**INTEROC S.A.**  
Av. Santa Cruz 875  
Oficina 300 - Miraflores  
Telf.: (511) 614-5100  
Lima - Perú

**Formulador:**  
**NINGBO GENERIC  
CHEMICAL CO., LTD.**  
Room 10-6, Shidai Square,  
No.8, Lengjing St. Ningbo  
Telf.: +86-574-87301088  
Zhejiang - China

Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : 1Kg  
Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

### “LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**  
-Este producto causa irritación moderada a los ojos.  
-El contacto prolongado o repetido puede causar alergia en ciertas personas.  
-Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.  
-No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.  
-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.  
-Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.  
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.  
-No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Imidazole.  
En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.  
En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar agua a la persona si está inconsciente.  
En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 min.  
En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lave la piel con abundante agua y jabón por 15 min.  
En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.  
Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático

**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**  
**CIPROSQUIM: 0800-5-0847. ESSALUD: 107 ó 0801-10200**  
**CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)**

**Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100**

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

-Altamente peligroso para peces y demás organismos acuáticos.  
-No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.

-No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.  
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos **10 metros**.  
-Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.  
-En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**TRECKER®**, es un fungicida sistémico, con acción curativa y protectante, que actúa interfiriendo la biosíntesis del ergosterol y aumentando la permeabilidad en la membrana celular, lo que conlleva a la muerte del hongo.

**TRECKER®**, se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, (usar de preferencia agua con pH 5 a 6), agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente. El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña al año, con un intervalo de 7 días entre aplicaciones. Aplicar a la presencia de la enfermedad y la segunda aplicación previa evaluación y si las condiciones ambientales favorecen la presencia de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a las dosis, y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/cil de 200L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	30 - 60	7	0.05

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO

