

TRECKER®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Triflumizole 500 g/Kg
Aditivos csp 1 Kg

PQUA N° 912 - SENASA



**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.

Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16. Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **1Kg**
Fecha de Vencimiento :



Formulador:
NINGBO SUNJOY
AGROSCIENCE CO., LTD.
1165 Beihai Road, Chemical
Industry Zone of Ningbo,
Zhejiang Province - China

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

-Este producto causa irritación moderada a los ojos.
-El contacto prolongado o repetido puede causar alergia en ciertas personas.
-Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
-No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
-Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
-No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Imidazole.
En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar agua a la persona si está inconsciente.
En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 min.
En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lave la piel con abundante agua y jabón por 15 min.
En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CIPROSQUIM: 0800-5-0847. ESSALUD: 107 ó 0801-10200
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

-Altamente peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
-No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.

-No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos **10 metros**.

-Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

-En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TRECKER®, es un fungicida sistémico, con acción curativa y protectante, que actúa interfiriendo la biosíntesis del ergosterol y aumentando la permeabilidad en la membrana celular, lo que conlleva a la muerte del hongo.

TRECKER®, se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, (usar de preferencia agua con pH 5 a 6), agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente. El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña al año, con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.

Aplicar a la presencia de la enfermedad y la segunda aplicación previa evaluación y si las condiciones ambientales favorecen la presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis, y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/cil de 200L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid	“Oidiosis”	<i>Erysiphe necator</i>	30 - 60	7	0.05
Pimiento	“Oidiosis”	<i>Leveillula taurica</i>	50 - 60	11	0.1

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO



TRECKER®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Triflumizole 500 g/Kg
Aditivos csp 1 Kg

PQUA N° 912 - SENASA



**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.**

Av. Javier Prado Oeste 2442.
Piso 16. Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

**Formulador:
ZHEJIANG HEBENPESTICIDE
& QUEMICALS CO.,S.A.**

Liandun Rd, Houjing,
Yanjiang Industrial Area,
Wenzhou, Zhejiang, P.R. China

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **1Kg**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

-Este producto causa irritación moderada a los ojos.
-El contacto prolongado o repetido puede causar alergia en ciertas personas.
-Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
-No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
-Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
-No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Imidazole.
En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar agua a la persona si está inconsciente.
En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 min.
En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lave la piel con abundante agua y jabón por 15 min.
En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático

**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CIPROSQUIM: 0800-5-0847. ESSALUD: 107 ó 0801-10200
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)**

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

-Altamente peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
-No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.

-No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos **10 metros**.
-Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TRECKER®, es un fungicida sistémico, con acción curativa y protectante, que actúa interfiriendo la biosíntesis del ergosterol y aumentando la permeabilidad en la membrana celular, lo que conlleva a la muerte del hongo.

TRECKER®, se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, (usar de preferencia agua con pH 5 a 6), agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente. El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña al año, con un intervalo de 7 días entre aplicaciones. Aplicar a la presencia de la enfermedad y la segunda aplicación previa evaluación y si las condiciones ambientales favorecen la presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis, y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/cil de 200L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid	“Oidiosis”	<i>Erysiphe necator</i>	30 - 60	7	0.05
Pimiento	“Oidiosis”	<i>Leveillula taurica</i>	50 - 60	11	0.1

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO



TRECKER®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Triflumizole 500 g/Kg
Aditivos csp 1 Kg

PQUA N° 912 - SENASA



**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.**

Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16. Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

**Formulador:
NINGBO GENERIC
CHEMICAL CO., LTD.**
Room 10-6, Shidai Square,
No.8, Lengjing St. Ningbo
Telf.: +86-574-87301088
Zhejiang - China

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **1Kg**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

-Este producto causa irritación moderada a los ojos.
-El contacto prolongado o repetido puede causar alergia en ciertas personas.
-Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
-No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
-Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
-No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Imidazole.
En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar agua a la persona si está inconsciente.
En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 min.
En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lave la piel con abundante agua y jabón por 15 min.
En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CIPROSQUIM: 0800-5-0847. ESSALUD: 107 ó 0801-10200
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

-Altamente peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
-No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.

-No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos **10 metros**.

-Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

-En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TRECKER®, es un fungicida sistémico, con acción curativa y protectante, que actúa interfiriendo la biosíntesis del ergosterol y aumentando la permeabilidad en la membrana celular, lo que conlleva a la muerte del hongo.

TRECKER®, se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, (usar de preferencia agua con pH 5 a 6), agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente. El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña al año, con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.

Aplicar a la presencia de la enfermedad y la segunda aplicación previa evaluación y si las condiciones ambientales favorecen la presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis, y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/cil de 200L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid	“Oidiosis”	<i>Erysiphe necator</i>	30 - 60	7	0.05
Pimiento	“Oidiosis”	<i>Leveillula taurica</i>	50 - 60	11	0.1

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO

