

Medidas: 27 cm x 18 cm  
Actualizado: Diciembre 2013  
ML

# TIRA

# TRIMAZINA

75 WP

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

### Composición Química:

Cyromazine ..... 750 g/kg  
Aditivos ..... csp 1 kg

Reg. PQUA N° XXX - SENASA

Titular del registro:

**MONTANA S.A.**

### Formulado y Distribuido por:

**MONTANA S.A.**

Av. Los Rosales 280,  
Santa Anita. Lima - Perú  
Teléfono: (511) 4193000  
E-mail: info@montana.com.pe

### Contenido Neto: 1 kg

Lote N°  
Fecha de Fab.:  
Fecha de Exp.:

# MONTANA

® Marca registrada

**NO CORROSIVO    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

Medidas: 27 cm x 18 cm  
Actualizado: Diciembre 2013  
ML

# RETIRA

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGA BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

### PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Triazina
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si esta consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- **Antídoto:** No tiene, dar tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
CIPROSQUIM: 0800-5-0847  
MONTANA: 419-3000  
ESSALUD: 107 o 0801-10200  
CICOTOX: 0-800-1-3040

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos y otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**TRIMAZINA 75 WP**, es un insecticida de ingestión, con acción traslaminar y sistémica (acròpetala). Es un regulador de crecimiento de estadios larvales, que interfiere en la formación de la cutícula de la larva, impidiendo que esta, se desarrolle normalmente.

**TRIMAZINA 75 WP**, se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen de agua a utilizar, (usar de preferencia agua con pH 5 a 6), agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente.

El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo. No aplicar en campos con problemas de humedad.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

### CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (g/dl)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	70	21	0.8

PC: Período de carencia  
LMR: Límite Máximo de Residuos

### FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACION:

- Aplicar cuando se detecte los primeros estadios de la larva, previa evaluación.
- Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña al año, con un intervalo mínimo de 7 días entre aplicaciones. La segunda aplicación previa evaluación.
- En caso se requiera de una nueva aplicación, usar otro plaguicida de diferente mecanismo de acción.
- No aplicar en época de floración, por ser muy peligroso para abejas.
- Como máximo aplicar 140 g/Ha.

### PERÍODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

### COMPATIBILIDAD

**TRIMAZINA 75WP** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de reacción neutra.

### FITOTOXICIDAD

**TRIMAZINA 75 WP**, no es fitotóxico a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

