

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE:

- Conserve en lugar seco y en su envase original.
- No lo transporte, ni almacene con alimentos y/o animales.
- Usar la mezcla inmediatamente después de preparada.
- Mantenga el envase bien cerrado y etiquetado.
- No reuse el envase, destrúyalo.
- No contamine los arroyos con el lavado de equipos de aspersión o con la eliminación de residuos.

PRIMEROS AUXILIOS.- Al contacto con la piel, lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.

NOTA AL MEDICO.- Tratamiento sintomático si aparece diarrea. No se recomienda el lavado gástrico a menos que se haya ingerido grandes cantidades.

DL₅₀ Oral aguda : > 23,585 mg/kg

DL₅₀ Dermal aguda : > 11,792 mg/kg

NO EXPLOSIVO • NO INFLAMABLE • NO CORROSIVO

Gib-liq®

(Giberelinas)

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICION QUIMICA:

Giberelinas 9.89 g/l
Extracto de Algas 901.1 g/l

REGULADOR BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Reg. PBUA N° 064-SENASA. Cont. Neto: 125 ml.
Expiración:
N° de Lote:

Formulado por:
 **Comercial Andina
Industrial S.A.C.**

Av Benavides 1579. Oficina 702.
Edificio Del Park II. Lima 18-Perú.

Distribuido por:
SUNNY VALLEY SAC
Calle Doña Amalia Surco
Lima Perú
Telf.: 358-3644

RESPONSABILIDAD CIVIL

El productor/vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y que es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse, por cualquier causa a consecuencia del uso, ya que las aplicaciones están fuera de nuestro control.

INDICATIVOS DE USO:

Es un Regulador de Crecimiento de plantas que favorece el crecimiento longitudinal de brotes, tallos y alargamiento de vainas.

Agitar el contenido antes de usar.

SISTEMA DE PREPARACION Y APLICACION:

Gib-liq por ser un concentrado soluble diluir en agua como vehículo de aspersión y para tratamiento de semilla de papa.

CULTIVO	DOSIS X 200 LTS AGUA	MOMENTO DE USO
Papa	125 ml	Tratamiento de semillas durante 5 minutos.
Vainita	125 ml	Inicio de formación de las vainas.

MANTENER ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES,
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES



**LIGERAMENTE TOXICO
PRECAUCION**

DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUES DE USAR EL PRODUCTO

