

MAMORPH 69 WP

Fungicida agrícola

Polvo Mojable - WP

Composición:

Mancozeb.....600 g/kg
Dimethomorph..... 90 g/kg
Aditivos..... c.s.p 1 Kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Contenido neto: 10 kg

N° Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Fabricado y formulado por:

**SHANDONG WEIFANG
RAINBOW CHEMICAL CO.,
LTD.**

Binhai Economic
Development Area, Weifang,
Shandong 262737, China

Titular de registro, Importador y Distribuidor:

**RAINBOW AGROSCIENCES
SAC**

General Varela N° 548 Dpto.105
Lima

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere, causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa. Peligroso si es inhalado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Guardar bajo llave, en lugares frescos secos y con buena ventilación.
- Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ditiocarbamato + morfolina
- En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente.
- En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua durante 10 minutos y cambiarse la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico especialista (oftalmólogo).
- En caso de inhalación: Trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
- Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.
- En caso de EMERGENCIA llamar a: CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas), ESSALUD EN LINEA: 411-8000 (Opción 4) o CISPROMQUIM: 0800-50-847.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido del producto, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE.

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua como ríos, estanques o arroyos con los restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MAMORPH 69 WP es un fungicida con actividad protectante, curativa, erradicante, translaminar y sistémico que se recomienda para el cultivo de papa en el control de "hielo" o "rancho".

Preparación y aplicación:

Para la preparación de la mezcla y aplicación considerar lo siguiente:

- 1-Hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.
- 2-La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.
- 3-La absorción de **MAMORPH 69 WP** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

CUADRO DE USOS Y DOSIS

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Enfermedad		Dosis	Periodo de Carencia (Días)	L.M.R. p.p.m.
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha		
Papa	"Rancho"	<i>Phytophthora infestans</i>	2.5	7	0.2 (1) 0.05 (2)

LMR = Límite máximo de residuos

1) Mancozeb

2) Dimethomorph

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos con reacción fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en el cultivo y dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

